

O Estado Sanitario do Estado do Paraná

Foi inteiramente satisfactorio o estado sanitario do Paraná, ao transcorrer o anno de 1927, não se tendo verificado nenhum surto de epidemia. Mesmo á margem dos grandes rios que banham as regiões do nordeste do Estado e no littoral a malaria manifestou-se mais discretamente, sem o lugubre cortejo de outros annos, facto que muito recommenda os serviços das inspectorias de prophylaxia. Curitiba é muito justamente considerada uma das cidades mais saudaveis do Brasil inteiro. A mortalidade attingiu, em 1927, a 14.0 por mil habitantes, tendo sido notificados 1.260 obitos que correspondem a uma media diaria de 3.41. No mesme periodo registraram-se 2,851 nascimentos ou sejam 31.8 por mil habitantes, equivalente a uma media diaria de 7.8. Mostram, pois, estes dados que houve um excesso de 1591 nascimentos sobre o numero de obitos occorridos. A organização dos serviços de hygiene e a criação de novos estabelecimentos dependentes do Directoria do Servico Sanitario ampliaram de tal modo a sua esphera de acção, que se torna mistér remodelar o quadro dos funcionarios internos da repartição, afim de serem attendidos convenientemente todos os trabalhos que lhe estão affectos.

Valor da Prova de Takata-Ara

O tirocinio da prova de Takata-Ara por Póvoa⁴ não é extenso, é não excede de 250 reacções, depois dos ensaios precisos da aprendizagem indispensavel. O material clinico pertence ao Hospital Nacional, ao dispensario de syphilis nervosa da Fundação Gaffrée e Guinle e alguns doentes de clinica particular. Em 150 liquidos cephalo-rachideos de estados morbidos os mais diversos, sem syndrome humoral apreciavel, a não ser positividades isoladas, em treze casos houve inespecificidade da reacção. Quanto ao typo II, meningitico, só em um caso de meningite pneumo-estaphylococcica purulenta o tom roseo se evidenciou com nitidez. Em quatro outros casos, foram desconstrados os resultados; em dois casos de meningite tuberculose, um foi negativa a reacção, noutro, houve precipitação metasiphilitica em 30. Em dois outros, de meningite purulenta houve tambem precipitação tardia (+). A reacção foi fiel nos casos de paralysis geral, quasi todos malarisados; em nove casos só uma vez foi negativa: era um remido clinicamente. Em ordem decrescente de epecificidade, em seguida á paralysis geral, veiu a lues cerebral: em dez casos houve tres resultados negativos. Na tabes, os resultados não foram animadores. Pode-se concluir ser o valor especulativo de reacção de Takata-Ara incomparavelmente maior que a sua importancia semiologica; que o typo II, meningitico, é demasiado infiel; que o typo I de reacção é valiosa contribuição ao diagnostico da paralysis geral. Sendo a reacção sublimado-fuchsina de Takata-Ara um recurso de merito no diagnostico da paralysis geral, é possivel venha ella prestar bons serviços no tocante á diagnose precocissima, no prognostico no curso da malariatherapia e na fixidez das remissões clinicas.

A Enterothermotherapia nas Parasitoses Intestinaes

Rivas⁵ declara que jo tem provado o seu methodo thermico intra-intestinal em 500 casos de helmintiasas: 103 de dysenteria amebiana, 21 de oxyurose, 6 de tricocephalose, 13 de giardase, 9 de trichomonose, 23 de teniase, 56 de ancylostomose, 3 de trichinose aguda e 234 de diarrhéas simples ou biliosas, colites simples e ulcerativas, antointoxicações de origem enterica e outras affecções indeterminadas do intestino. A dita therapeutica, por meio de applicação com o tubo duodenal de solução salina á temperatura de 45° a 47°, foi um processo efficiente

⁴ Próvoas, Héllion, Arch. Bras. Med. 4:217 (ab.) 1929.

⁵ De Rivas, Damaso: Rev. Med.-Cir. Brasil 2:37 (fev.) 1929.