

Tuberculosis.—En su trabajo escrito, el Dr. Arboleda Díaz expone con todo detalle la organización y marcha de la lucha antituberculosa en *Colombia*. El número de dispensarios, que en 1936 era de 3, es ahora de 28, y más o menos el mismo incremento se ha observado con respecto a personas atendidas y servicios prestados. En cuanto a tratamiento y profilaxia, en 1939 se practicó el neumotórax en 862 personas. En la campaña de divulgación se han utilizado todos los medios, incluso afiches, el radio, la prensa, el cinematógrafo, etc. El A. calcula en 10 millones de pesos colombianos la pérdida económica anual de 100,000 tuberculosos al individuo y a la colectividad, y recomienda el establecimiento del seguro social.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS COMPUESTAS*

Por el Dr. JAMES E. M. THOMSON

He aquí recapitulados los 10 grandes principios del tratamiento de fracturas compuestas:

I.—Empléese una férula e inmovilícese en el mismo sitio del accidente toda fractura compuesta; trasládese al enfermo con celeridad y sumo cuidado a un hospital debidamente instalado para tratamiento.

II.—Considérese como caso de urgencia toda fractura compuesta, proporcionando cuanto antes el tratamiento adecuado.

III.—Lávese el miembro, pero alejando el líquido de la herida, con jabón verde y agua esterilizada corriente por 10 minutos.

IV.—Desbrídese perfectamente toda herida, tomando debidamente en cuenta la anatomía, y ciérrense las heridas en que parece justificarlo así el juicio clínico.

V.—Redúzcase después del desbridamiento toda fractura compuesta, y fíjense en posición firmemente los fragmentos.

VI.—Cúbrase la herida con cristales de sulfanilamida y adminístrense sulfonamidos por vía bucal, según esté indicado.

VII.—Inmovilícese toda fractura compuesta en un enyesado, pero con aberturas adecuadas para observar la herida y tejidos circundantes.

VIII.—Adminístrense en el acto en toda fractura compuesta una inyección profiláctica de suero antitetánico combinado con suero antibacilar *welchii-perfringens*.

IX.—Adminístrense una dosis profiláctica de rayos X dos veces diarias por espacio de tres o cuatro días, sobre todas las fracturas compuestas.

X.—Úsese la pectinoterapia en todas las heridas abiertas superficiales.

Como los Diez Mandamientos del Señor jamás son absolutamente obedecidos, así sucede con estos 10 para el tratamiento de las fracturas compuestas, pero facilitan una serie de reglas que pueden servir de mucho. Si todo cirujano que trata fracturas estableciera un plan completo que abarcara todas las fases o posibilidades e hiciera que sus ayudantes lo siguieran implícitamente por cinco años, se vería que sus resultados superan con mucho a los de cualquier período anterior.

* Sumarizado del *Jour. Am. Med. Assn.*, nbre. 30, 1940, p. 1855.