

para obtener buen resultado. El mismo medicamento no tiene ninguna acción en los casos mixtos.

El stovarsol, como todos los arsenicales orgánicos y en especial los de la serie aromática, puede determinar neuritis y atrofia óptica. Este inconveniente se subsana suspendiendo las inyecciones en cuanto sea ligeramente turbada la visión.

Los Anófeles del Uruguay

En los primeros estudios sobre anófeles del Uruguay, practicados por Gaminara y Tállice,¹ se encontraron larvas de anofelinos en los Departamentos de Durazno, Tacuarembó, Salto, Florida y Colonia. La cría de estas larvas dieron adultos que fueron clasificados como *Anopheles* o *Nyssorhynchus argyrotarsus*. Los adultos no pudieron ser habidos en estas investigaciones, suponiendo que lleven una vida salvaje. Los anopheles del Uruguay no parecen ser paludígenos, pues hasta ahora no se ha encontrado paludismo autóctono.

La Vacunación BCG contra la Tuberculosis

Chile.—En Chile, iniciaron en 1926 la vacunación BCG en los recién nacidos. Fontecilla² resume así los resultados obtenidos hasta ahora: “El total de vacunados hasta esta fecha es de 400. La mayor parte de los vacunados están sometidos al control médico y al control social mediante las visitadoras. El escaso tiempo transcurrido no permite a los informantes establecer ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, es conveniente decir desde luego que todas las clínicas están acordes en proclamar la absoluta inocuidad del procedimiento. Como se comprende, algunos de los vacunados han fallecido, y en la parte pertinente del informe dice el Dr. Ariztia: ‘Debe dejarse constancia de que en ninguno de estos niños se comprobó síntoma alguno que hiciera pensar en afecciones tuberculosas.’ Debemos agregar que buen número de los niños vacunados provienen de padres tuberculosos. En resumen podemos afirmar: 1º, que el procedimiento de Calmette-Guérin es absolutamente inocuo; 2º, que no hemos descubierto hasta ahora en ninguno de los vacunados ni la menor afección que pueda sospecharse de naturaleza bacilar. Nos hemos propuesto vacunar el número necesario que nos permita llegar a tener bajo el control más completo posible a 400 niños. De los vacunados hasta hoy, hemos perdido de vista a 100 niños, poco más o menos. Dadas las costumbres de nuestro pueblo esto es casi inevitable.”

¹ Gaminara, Angel y Tállice, Rodolfo V.: Primeros estudios sobre anopheles del Uruguay, An. Fac. Med. 12: 582-587 (sbre.-obre.) 1927.

² Fontecilla, O.: La vacunación anti-tuberculosa en Chile, La Clínica, 4: 805-808, (dbr. 1) 1927.