

FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA EN BOLIVIA*

En 1949 se diagnosticaron mediante examen histopatológico 4 casos letales de fiebre amarilla selvática en Bolivia. El primero se presentó el 23 de enero en Garabato, provincia Sara del Departamento de Santa Cruz, 15 km. al noreste de Portachuelo; el segundo, procedente del Brasil, el 20 de febrero en Guayaramerín, provincia Vaca Díez del Departamento del Beni; el tercero, procedente del Alto Parapetí, y el cuarto, se registraron respectivamente el 7 de abril y el 13 de julio en Lagunillas, provincia Cordillera, y en San Ignacio, provincia Velazco, ambas en el Departamento de Santa Cruz.

Los brotes siguientes fueron de casos comprobados posteriormente por historias clínicas y ocurrieron en lugares de difícil acceso ubicados en el sur del Departamento de Santa Cruz: 1 caso procedente de la hacienda "Rincón del Limón" y fallecido el 10 de marzo en Masicurí, provincia Valle Grande; 6 casos con 2 defunciones entre marzo y abril en la hacienda "Rincón del Limón" (19.02° latitud S y 63.6° longitud O.), provincia Cordillera, entre el camino Camiri-Santa Cruz y Río Grande, y cerca del lago Opabusu; 4 casos con 1 defunción en mayo en Ipitacito del Monte, provincia Cordillera, 10 km. al norte de Gutiérrez y sobre el camino Camiri-Santa Cruz; 79 casos con 36 defunciones entre marzo y mayo en el valle del río Alto Parapetí (20.05° latitud S y 63.7° longitud O.) situado en línea recta entre Camiri, provincia Cordillera, y Muyu-pampa, provincia Azero, Departamento de Chuquisaca. También se tuvieron noticias de los siguientes casos sospechosos, ninguno de los cuales se pudo confirmar: 1 ó más casos ocurridos a principios del año cerca de Caranavi, Provincia Nor Yungas, Departamento de La Paz; 6 casos habidos en junio y julio en Achiquiri lugar situado en el Departamento de La Paz, al norte de Mapiri y sobre un afluente del río Kake; 9 casos registrados durante enero y febrero a lo largo del río Madidi y en el cantón San Lorenzo, provincia Madre de Dios, Departamento de Pando; 9 casos ocurridos entre marzo y abril en la hacienda "Rincon del Limón," y 5 casos con 1 defunción registrados en diciembre en la hacienda "Puerto Alegre" ubicada en la provincia Cercado, Departamento del Beni, cerca de San Pedro y 60 km. al norte de Trinidad. Durante el año fueron vacunadas unas 21,251 personas en 117 localidades de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Pando y Beni. El país permaneció libre de *Aedes aegypti*, no habiéndose encontrado este mosquito en ninguna de las 111 localidades inspeccionadas, 59 de las cuales estuvieron infectadas en épocas anteriores.

La Oficina Sanitaria Panamericana ha tenido conocimiento de dos epidemias de fiebre amarilla selvática ocurridas en Bolivia de enero a

* Preparado por la Sección de Epidemiología y Estadística de la Oficina Sanitaria Panamericana.

abril de 1950. La primera se presentó en una región montañosa de la provincia Azero, Departamento de Chuquisaca, que había permanecido limpia en los 18 años que tiene de existencia el Servicio de Fiebre Amarilla y que en 1901-1902 experimentó una fuerte epidemia. Según datos al 17 de marzo de 1950, fecha en que ya estaba dominada la epidemia, se diagnosticaron por historias clínicas como 850 casos con 230 defunciones en una población de unos 18,000 habitantes. Esta epidemia parece haberse originado aproximadamente el 1 de enero en San Pablo de Huacareta situado sobre el río Parapetí. La región afectada se extendía por el norte desde Thiumayu donde hubo un caso, el río Azero, Monteagudo y posiblemente Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) y por el sur desde las cercanías de Añimbo e Ingre, donde hubo casos; por el este desde la provincia de Vaca Guzmán donde ocurrieron 17 casos con 4 defunciones, y la parte occidental de Luis Calvo, y por el oeste desde las alturas que rodean la cabecera del río Parapetí. La región afectada se prolongó por el este hasta las zonas vacunadas situadas sobre el camino entre Lagunillas y Camiri, provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz, en donde se registraron cerca de 20 casos. De más de 21,000 vacunaciones practicadas, 4,000 lo fueron en áreas adyacentes. Un segundo brote de 17 casos con 8 defunciones ocurrió durante abril a lo largo del río Tamampaya, provincia Sud Yungas, Departamento de La Paz.