

Primeiro Congresso Internacional de Hygiene Mental

Está marcado para 5 de maio de 1930, o primeiro Congresso Internacional de Hygiene Mental, cuja séde será em Washington e durará até o dia 10 de maio, sendo presidente de honra o Sr. Herbert Hoover, actual Presidente dos Estados Unidos de America; Presidente, o Dr. William A. White; Secretario geral, Sr. Clifford W. Beers; secretario administrativo, Sr. S. R. Schillady. Entre os vice-presidentes apparecem os nomes do Dr. H. S. Cumming, Director da Repartição Sanitaria Pan-Americana, e do Dr. Ray L. Wilbur, Secretario de Estado do Interior. Como patronos no estrangeiro, figuram os nomes de varios cientistas e medicos de quasi todas as partes do mundo. Um resumo do programma foi publicado no BOLETÍN de março, p. 324.

O Problema Brasileiro da Eschistosomose Intestinal

Maciel ⁵ disse, legado da escravatura africana, a eschistosomose intestinal espraia-se pelo Brasil de um modo vertiginoso. Localizado a principio no nordeste brasileiro, o *Schistosoma mansoni* tem encontrado hospedeadores intermediarios adaptaveis em todo o territorio da Federação. Do grande foco formado por Sergipe, Alagoas, Pernambuco, sudeste do Ceará e do Maranhão e nordeste da Bahia, a parasitose tem partido para outras regiões, constituindo focos autochtones, que se alargam e ameaçam invadir zonas até então não attingidas. Outras medidas adoptadas contra a ancylostomose são de salutar effeito contra a eschistosomose, de modo que para as localidades onde haja campanha emprehendida contra aquella helminthose, a problema é de execução relativamente facil, bastando ampliar as medidas de protecção do homem e de combate do eschistosomo.

Tratamento Correcto da Diptheria

Afim de bem cumprir as indicações que a pratica tem demonstrado, no tratamento da diptheria, precisa o clinico ater-se estrictamente aos seguintes principios: ⁶ 1º, Sempre que suspeitar de diptheria, deve sem demora fazer o tratamento especifico e só depois procurar esclarecer o caso microbiologicamente (tratamento precoce). 2º, Ao fazer a injección de antitoxina, deve lembrar-se que é preciso atacar o mal de uma só vez, com dose sufficiente; e, como quasi sempre o tratamento já não é muito precoce, essa dose total deve ser grande, alcançando pelo menos 5,000 unidades para os lactentes e 10,000 para as crianças mais crescidas (tratamento intensivo). 3º, Nos casos graves e malignos, ou tratados muito tardiamente, as doses devem ir a 20,000, 30,000, 50,000 e até 100,000 unidades, para o que, ao menos em parte da dose, deve ser utilizada a via intravenosa (acção thérapeutica rapida).

A Biometrica no Brasil

Prata ⁷ deduz de 1,000 casos obstetricos que a altura média das gestantes no Rio é de 1.52 m. par as brancas; 1.54 para as pretas; e 1.50 para as pardas. O peso médio das gestantes, ao entrarem na clinica, é de 55.417 kgms., para as brancas; 61.361, para as pretas e 56.585, para as pardas. Esse peso após o parto reduziu-se respectivamente, a 50.666, 53.430 e 51.912. As gestantes de raça negra são mais altas no periodo puerperal e apresentam maior peso que as de raça branca. As pardas são de estatura menos elevada, porém, apresentam maior peso médio nas condições acima referidas. A mensuração geral da bacia forneceu a seguinte média BE—22.6 cms.; BC—25.3 cms.; BI—10.9 cms.; CE—

⁵ Maciel, Heraldo: Rev. Hyg. & Saude Pub. 3: 263 (dbro.) 1929.

⁶ Monteiro, Oswaldo G.: Folha Med. 11: 8 (jan. 5), 1930.

⁷ Prata, A.: Bol. Eug. 1: 4 (sbro.) 1929.