

Diagnostico Biologico das Cysticercoses Cerebraes

Em 1911 Moses, relatava tres casos de cysticercose, sendo que em 1 delles, pesquisou os anticorpos no liquido cephalo-racheano, obtendo resultado positivo, apresentando o doente manifestações nervosas, taes como ataques convulsivos; nos outros dois só pesquisou os anticorpos no sangue. Em collaboração com os Drs. Pessô e Corrêa, Fleury Silveira⁷ tem estudado cuidadosamente estas questões, e tivera occasião de praticar, em um doente o desvio do complemento no liquido cephalo-racheano. Chama a attenção dos que se interessam pelo assumpto, que os meios biologicos para o diagnostico da cysticercose são variados e bem seguros: desvio do complemento no soro sanguineo e no liquido cephalo-racheano; intrádermo-reacção; curva leucoeytaria.

O Cancer no Rio de Janeiro

Em 26 annos⁸—periodo de 1903 a 1928—no Rio de Janeiro (Districto Federal), occorreram 577,428 obitos, sendo 321,016 do sexo masculino e 256,412 do feminino. Do total dos fallecidos, 10,911 foram victimas de cancer ou outros tumores malignos, dos quaes 5,102 pertenciam ao sexo masculino e 5,809 ao feminino. Estes numeros fornecem as seguintes relações: 1.6 por cento, homens; 2.3 por cento, mulheres; 1.9 por cento sem discriminação dos sexos. Pela idade: Menores de 1 anno, 9; de 1 anno, 10; de 2 annos, 19; de 3 annos, 15; de 4 annos, 16; de 5 a 9 annos, 22; de 10 a 14 annos, 31; de 15 a 19 annos, 56; de 20 a 29 annos, 435; de 30 a 39 annos, 1,164; de 40 a 49 annos, 2,615; de 50 a 59 annos, 2,951; de 60 a 69 annos, 2,270; de 70 a 79 annos, 1,021; de 80 a 89 annos, 219; de 90 a 99 annos, 38; de 100 annos e acima, 13; de idade ignorada, 7. Pela nacionalidade: Brasileiros, 6,775; estrangeiros, 4,136. Pela cor: Brancos, 8,362; pardos, 1,557. Para cada obito de mulher, occasionado pelo cancer, corresponde expressão numerica mais elevada de homens. Para a cavidade buccal, 4.4; para o estomago, 2.4; para o figado, 1.3; para o peritoneo, intestinos e recto, 1.1; para a pelle, 1.9; para outros orgãos e orgãos não especificados 1.1. Incluindo, porém, o cancer ou outros tumores malignos dos orgãos genitae da mulher e do seio, que figuram, respectivamente, com as porcentagens de 10 por cento—valores sem equivalentes para o sexo masculino—verifica-se que a mulher passa a pagar maior tributo á morte pelo cancer do que o homem. A queda brusca, observada a partir do quarto quinquennio (1918-1922), da mortalidade pelo cancer de "outros orgãos e de orgãos não especificados," coincide com a elevação mais accentuada de mortalidade de todas as sédes, e do conjuncto de sédes, sendo flagrante a dos orgãos genitae da mulher, que parecia baixar até aquella época e que sobe sensivelmente, e a do estomago e do figado, que, gradativamente maior, passou a augmentar ainda mais. O numero total de casos tem augmentado de 254 no anno 1903, a 404 no anno 1913, 553 no anno 1923 e 632 no anno 1928.

A Tuberculose no Brasil

Segundo de Freitas,⁹ existem 350,000 tuberculosos no Brasil. Comparando os estragos deste grande mal com os das outras doenças, mostra que ella só, mata por todas as outras reunidas. Em Recife, por exemplo, de 1852 a 1928 morreram de tuberculose 60,789 pessoas e de todas as outras symoses 52,711. A cooperação dos governos na campanha contra a tuberculose se impõe a todo o movimento, não somente por um gesto de simples beneficencia e sim de solidariedade humana e de justiça social.

⁷ Fleury Silveira, G.: Rev. Biol. Hyg. 107 (1929).

⁸ Briggs, Luiz: Folha Med. 10: 375 (nbro. 5) 1929.

⁹ Freitas, Octavio de: Rev. Hyg. & Saude Pub. 3: 262 (dbro.) 1929.