

dystrophia symples ou perturbação do balanço de Finkelstein, dyspepsia albuminosa de Combe), a dystrophia farinacea (*Mehlmaehrschaden* de Czerny-Keller), a doença de Barlow e as anemias alimentares; ao 4º sub-grupo, enfim, destina a dyspepsia e a intoxicação, preferindo deixar aqui mesmo este typo clinico, si bem que reconheça poder estar elle tambem incluído no grupo das perturbações ex infecção, como querem Czerny e Keller. No grupo das dystrophias ex constitutione dispõe as principaes: diathese exsudativa, d. neuropathica e d. espasmophilica. No grupo das desordens infecciosas distingue as parentericas e as entericas, asignalando entre estas as enterites, as colites, as dysenterias. A critica que poderá ser feita de não ficar a superalimentação incluída ao lado da subalimentação como typo clinico, pondera o auctor que o quadro da subalimentação tem características proprias, o que não acontece com a superalimentação, a qual se apresenta sob modalidades diversas. A decomposição de Finkelstein, ou atrophia de Langstein, ou athresia de Parrot constitue o termino possivel de qualquer das dystrophias, si não acudidas em tempo opportuno. Gonzaga pretende que o seu eschema seja conciliador, entendendo que com um pouco de boa vontade poderá ser admittido sem violencia ás convicções de cada especialista, seja qual fór a escola a que se filie, e o plan tem sido adoptado officialmente no ensino da cathedra de Pediatria Medica da Faculdade do Rio.

Nova Especie de Sporotrichado Brasileiro

De uma menina de 12 annos de idade, residente no Rio Grande do Sul (St. Antonio da Patrulha), portadora de vegetações duras e crostosas localizadas no nariz e ladeadas por dois abcessos miliares, Pereira Filho³ isolou uma nova especie de esporotrichado. Evidentemente, não se trata de uma esporotrichose de forma fungosa produzida pelo *Sporotrichum beurmanni*, o mais commum dos esporotrichados, visto que a temperatura optima do cogumelo isolado é de 37° C., contrariamente ao que se observa na especie cosmopolita. Além disso não conseguiu-se verificar o matiz pardo-chocolate familiar aos esporotrichos de Beurmann e Jeanselme. Excluiu-se tambem o esporotricho de Schenk por que o cogumelo isolado não apresentou filamentos mycelianos ondulosos e reunidos em coremio. A ausencia de filamentos moniliformes e de côr negra nas culturas não permite identical-o á especie de Gougerot. Não se trata ainda do *Sporotrichum asteroides* de Splendore, que se reconhece facilmente pela disposição estrellada dos espóros fusiformes na extremidade dos filamentos. Trata-se aparentemente de uma nova especie de esporotrichado, que o auctor propõe denominar *Sporotrichum fonsecæi*, em homenagem ao eminente mycologo Prof. Olympio de Fonseca, filho. Descreveu-se na Allemanha ha pouco tempo o *Sporotrichum epidermidis*, cuja acção pathogenica parece-se approximar-se da nova especie aqui referida, ambos sendo responsaveis por lesões muito superficiaes.

Os Levemente Infestados nas Campanhas Sanitarias contra a Ancylostomose

Do estudo da literatura e de seis observações, Pessoa⁴ deduz: No estado actual dos nossos conhecimentos, não está provado que os "levemente infestados" com ancylostomose sejam sem importancia para a saude publica. O criterio de "levemente infestado" varia enormemente, devido á chamada resistencia individual, e, principalmente quando da presença de factores anemiantes, taes como alcoolismo frequentemente, apresentam uma symptomatologia em desacordo com o numero de vermes albergados. Mesmo em individuos mental e physicamente normaes, um pequeno numero de vermes modifica a formula

³ Pereira Filho: Rev. Med. Cir. Bras. 37: 265 (julho) 1929.

⁴ Pessoa, Samuel B.: Bol. 138 Inst. Hyg. S. Paulo. 1929.