

SECTION FRANÇAISE

*Traitement du pian par le stovarsol.*¹—Le pian est d'une extrême fréquence en Côte d'Ivoire, aussi bien sur le littoral que dans l'hinterland; dans les zones d'endémicité, tous les enfants sans exception sont frappés. *M. G. Bouffard* rapporte les excellents résultats obtenus avec le stovarsol, qui a le gros avantage de pouvoir être absorbé par la voie buccale.

Chez les enfants au-dessous de 8 ans, la cure s'obtient par l'absorption, 2 jours de suite, de 3 comprimés de 0 gr. 25: cette dose s'est toujours montrée inoffensive, même administrée à des nourrissons de moins d'un an. De 8 à 15 ans, il faut prescrire 8 comprimés en 2 jours. Les adultes, pour guérir, doivent absorber 4 comprimés 3 jours de suite.

Les pianiques arséno résistants d'emblée sont très rares, mais existent. Les récidives rapides ne s'observent qu'exceptionnellement (5 pour 100); les récidives lointaines ne représentent que 2 à 3 pour 100 des cas traités.

*Contribution aux essais de traitement de la trypanosomiase humaine par le tryponarsyl.*¹—*MM. G. Ledentu* et *M. Vaucel* ont expérimenté le tryponarsyl ou paraglycinamide-phénylarsinate de soude (médicament belge très voisin de la tryparsamide) chez 25 malades atteints de maladie du sommeil.

A la 1^{re} période de la trypanosomiase, les 4 cas traités donnèrent 4 succès. A la 2^e période, 13 cas fournirent 9 succès, 1 amélioration, 3 échecs.

Le médicament s'administre, par la voie intraveineuse, en injections hebdomadaires (de 0 gr. 035 à 0,09 du médicament par kilogramme).

Quatre malades ont eu des troubles oculaires, qui se sont bornés, dans 3 cas, à une amblyopie passagère cédant à l'interruption du médicament.

*Prophylaxie de la fièvre jaune.*¹—Le Ministre des Colonies avait demandé à la Société des indications visant la prophylaxie de la fièvre jaune. *M. E. Marschoux* déposa son rapport, au nom de la

¹ Communications à la Société de Pathologie Exotique, 9 novembre, 1927, en *La Presse Médicale*, 1927, xxxv, 1481.