

Los hornos crematorios de vapor se encuentran en un edificio aparte, construido cerca del matadero, con objeto de proveer a ambos del máximo de luz y aire.

La Encefalitis Epidémica en el Perú ⁷

En este minucioso estudio de la encefalitis epidémica, el autor afirma que ha habido unos cincuenta casos de 1919 a 1924, con una mortalidad media de 13 por ciento, o sea mucho menos que en Europa y otros países de América.

Encefalitis Postvacunal ⁸

Al comentar los autores los casos de encefalitis postvacunal, comunicados de varios países europeos, declaran que en España no se ha podido observar hasta el presente un solo caso. Con la vacuna enviada por el Instituto de Higiene Militar, que es sumamente virulenta y empleando dosis grandes y escarificaciones extensas se trató de provocar reacciones de alergia específica, y con ello la aparición de signos nerviosos en los probables portadores, procedentes de la primera y próxima vacunación. Casi todos los individuos que acusaron una reacción positiva la primera vez, también la dieron positiva y más intensa en la revacunación, lo cual demuestra la existencia de hipersensibilidad. Los resultados coincidieron en cuatro lotes que comprendían cada uno de 100 a 150 individuos. Sin embargo, esas intensas reacciones de alergia específica no pudieron evocar ni el más ligero síntoma nervioso achacable a la reactivación del virus jenneriano. De un mes a cuatro meses de la vacunación antivariolosa positiva 1,000 individuos, y de doce días a un mes después cerca de 2,000 fueron inyectados con vacuna antitifoidea, sin encontrarse ningún signo nervioso salvo temblor generalizado y remitente que se exacerbó a raíz de las inyecciones antitíficas, pero cuya existencia databa de la niñez.

Estado Sanitario del Uruguay durante 1926⁹

Con la nota respectiva, el Consejo Nacional de Higiene envió al Ministerio de Industrias la siguiente información:

"ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS

"El estado sanitario del país, en el año 1926, ha sido en general satisfactorio. De las enfermedades comprendidas en la agrupación denominada *infecto-contagiosas*, la *gripe* fué la que adquirió mayor difusión, propagándose en algunas localidades en forma epidémica, sobre todo en la Capital durante el mes de julio, sin presentar mayor gravedad, revistiendo el carácter de la influenza o gripe de estación.

"El Consejo, en la debida oportunidad, se preocupó de recoger las informaciones del caso, tendientes a establecer el grado de difusión de la enfermedad e impor-

⁷ Por L. D. Espejo. *Crónica Médica*, Lima, vol. XLIII, noviembre de 1926.

⁸ Por F. J. Ontiveros y J. D'Harcourt. *Medicina Ibero*, Madrid, vol. XI, marzo 12 de 1927.

⁹ Excerpta del *Boletín del Consejo Nacional de Higiene* de Montevideo, Uruguay, febrero de 1927