

O revestimento de suas ruas e estradas por meio de um calçamento apropriado intensifica-se cada vez mais. E, pois, a redução da taxa de tuberculose, agora verificada, não é um phenomeno passageiro e transitorio. Ella reflecte, de um modo suggestivo, as excellentes condições de salubridade da capital de Pernambuco que entrou, definitivamente, na promissora phase da mais completa remodelação sanitaria. (De Freitas, O.: *Rev. Hyg. Saúde Pub.* 54 (fvro.) 1930.)

#### Filial de Santos, Cruz Vermelha Brasileira

O movimento dos dispensarios para prophylaxia e saneamento de impaludismo, verminoses, syphilis, molestias venereas, vias urinarias, gynecologia, e do Serviço de Assistencia e Protecção á Mulher Gravida, da Filial de Santos da Cruz Vermelha Brasileira, durante o anno de 1930, foi o seguinte: Enfermos attendidos e medicados 127,485: 42,225 homens e 85,260 mulheres. No Posto da Syphilis e Molestias Venereas (fundado em 14 de julho de 1920), enfermos matriculados, 2,518: 1,658 brasileiros; 839 homens e 1,679 mulheres; 2,286 maiores e 232 menores; 2,129 brancos e 389 de côr. Frequentaram o dispensario 74,137 enfermos, sendo 19,034 homens e 55,103 mulheres. Applicaram-se 49,252 injeções, e foram feitos 11,712 curativos. No Posto do Impaludismo e das Verminoses (fundado em 14 de julho de 1926), enfermos matriculados 3,132: 2,619 destes brasileiros; 1,575 homens e 1,557 mulheres; 941 maiores e 2,191 menores; 2,808 brancos e 324 de côr. Frequentaram o dispensario 27,891 enfermos: 13,304 homens e 14,587 mulheres. Applicaram-se 12,895 injeções; foram dados 7,279 vermifugos; distribuidos 3,129 comprimidos de azul de methyleno, 105,811 de protaxalato de ferro, 1,180 de ankylostomina, 1,639 capsulas de perodiol, 23 de thymol e fêto-macho e foram feitas 18 transfusões de sangue. Pelo medico do serviço foi examinado o sangue (dosagem de hemoglobina) de 3,132 enfermos. No Serviço de Vias Urinarias e Gynecologia (fundado em 14 de julho de 1928) matricularam-se 577 enfermos: 277 homens e 300 mulheres: 548 maiores e 29 menores; 510 brancos e 67 de côr; 213 solteiros, 304 casados e 31 viuvos. Frequentaram os dispensarios 14,900 enfermos: 7,196 homens e 7,704 mulheres. Applicaram-se 4,655 injeções, sendo 723 tonicas, 32 de urotropina e 3,900 vaccinas anti-gonococcicas. Serviço de Assistencia e Protecção á Mulher Gravida (fundado em 1º de março de 1929), matriculas 322, brasileiras 242. Frequentaram o serviço 4,008 gestantes. No Laboratorio de Analyses Clinicas (installado em 14 de julho de 1920) foram feitos 9,371 exames, sendo 4,128 de fezes, 875 de urina e 3,080 de sangue. De 1920 a 1930, total de matriculas, 31,350; de consultas, 366,792; de injeções, 239,083; de curativos, 49,950; de vermifugos, 28,915; analyses clinicas, 41,779; enfermos, 31,350: maiores, 19,641, y menores, 11,709. (*Informação enviada pelo Director Clinico, Dr. Leão de Moura.*)

#### Trachoma

*São Paulo.*—Fonseca, após algumas considerações sobre a necessidade de ser conhecido o numero approximado de trachomatosos no Estado de São Paulo, os focos mais intensos e a vantagem de ser uniformisada a campanha com uma centralisação propõe o questionario do Congresso de Ophthalmologia de Amsterdam com algumas modificações pedindo a todos collegas e socios que anualmente organizem estatisticas dos casos de trachoma de accordo com o presente formulario: (1) O numero de trachomatosos em relação: á população total do municipio; ao numero de doentes de olhos examinados; (2) Dados epidemiologicos relativos aos seguintes elementos: idade; procedencia; profissão; côr; sexo; estado civil; habitação (particular ou collectiva); si frequentam escolas e quaes; (3) Cegueira parcial e total produzida por trachoma; (4) Que providencias sociaes (directas ou indirectas) teem sido tomadas contra o trachoma; (5) Quaes as condições geographicas da zona (clima, altitude, altura, etc.); (6) Que processos

therapeuticos teem sido empregados no tratamento do trachoma; (7) Dados historicos sobre a entrada dos trachomatosos no Estado; (8) Suggestões e ideas pessoasas sobre a etiologia, modo de contagio, prophylaxia e therapeutica do trachoma. Apresenta a estatistica de 1927 feita no Serviço de Olhos da Escola de Medicina a cargo do Prof. J. Britto, onde se verifica que foram matriculados 1,994 doentes de olhos, sendo 428 trachomatosos assim classificados: Profissão: domestica, 165; operarios, 55; lavrador, 52; escolar, 29; commercio, 3; costureiras, 4; outras profissões, 3; garçon, 1; barbeiro, 1; bordadeira, 1; chauffeur, 1; industrial, 1; nenhuma (menores e velhos), 112. Total: 428; sexo: masculino, 141; femenino, 287; estado civil: menores, 149; casados, 149; solteiros 107; viuvos, 23. Total: 428. Edades: de 0 a 3 annos, infantil, 22; de 4 a 6 annos, pre-escolar, 28; de 7 a 15 annos, escolar, 125; de 16 a 45 annos, adultos, 200; de 46 a mais, velhos, 53. Cegueira parcial ou total produzida pelo trachoma: parcial (leucomas) 42; total (atrophia bulbar e cégos de em olho), 8; predispostos a cegueira (ulceras), 46. Apresentou finalmente suggestões de prophylaxia do trachoma quer pelos poderes publicos quer por particulares com as creações de ligas anti-trachomatosas. Discutiram os Drs. W. B. de Mattos, Pereira Gomes, Moacyr, A. Bussaca, etc., e por proposta do Dr. de Mattos ficou resolvido que a sociedade officie ao Director do Serviço Sanitario offerecendo o seu auxilio na orientação anti-trachomatosa. (*Rev. Otto-Neuro-Oft., Cir. & Neur.* 86 (fbro.) 1931.

*Ceará*—No Centro Medico Cearense o Dr. Pedro Menescal exteriorizou o seu espanto em face da devastação do trachoma. Em Russas, onde esteve ha pouco, observou que 50 por cento da população, sobretudo escolar, está accommettida do terrivel mal. O Dr. Samuel Uchôa acha exaggerada a porcentagem de 50 por cento. Conhece a devastação do trachoma na capital e no sertão, por isso mesmo desde abril que o combate sem tregua. Descreve os meios de que lançou mão no combate e na prophylaxia do trachoma, lucta que ainda prosegue cada vez mais activa e diz ter sido admiravel o trabalho do Dr. Paulo Rodrigues nesse particular. O Dr. Helio de Goes Ferreira vae tambem trabalhando com intensidade no combate ao trachoma em Fortaleza, podendo assegurar que dentro em breve elle estará extinto. O seu campo já abrange Porangaba e por estes dias alcançará Maranguape. (*Ceará Medico*, 19, dbro (1930.))

#### Mortalidade Infantil no Rio

No anno de 1929 nasceram mortos, no Districto Federal, 2,854 fetos para um total de 39,042 nascimentos, ou seja um coefficiente de 73.10 por 1,000. O Dr. Amadeu Fialho, que, em serviço da Saude Publica examina as crianças nati-mortas e as estuda anatomo-pathologicamente, assevera que mais de 50 por cento apresentam signaes de lues congenita. Em 1929, houve um total de 5,891 mortes de 0 a 1 anno, das quaes 1,552 no 1º mez de vida. De 1 a 5 annos a mortalidade attingiu 3,653 e de 5 a 10, 630. Sobre 1,000 nascimentos houve 162 obitos no 1º anno de vida; no 2º 55 por 1,000; no 3º 23 por 1,000; já no 4º anno apenas 8 por 1,000. O factor hereditario de maior monta é sem duvida a syphilis e dizimou, em 1929, 398 menores de um anno. O alcool é outro elemento infanticida, os transtornos digestivos, as diarrhéas verdes, as gastro-enterites formam em primeira linha com 2,518 victimas de 0 a 1 anno. A alimentação artificial mal orientada e impropria é a fonte desse grande mal. Emquanto que no aleitamento natural apenas 3 por cento das crianças morrem por transtornos digestivos, no artificial esse numero sobe a 30 ou 40 por cento. A pneumonia, a bronchite, a diphtheria e todas as demais infecções graves desse aparelho fizeram, em 1929, 1,006 mortes de 0 a 1 anno. As febres eruptivas, como sarampo, variola, etc., formam o grupo das causas infectuosas, juntamente com as doencas epidemicas gripe, coqueluche, etc. A coqueluche ceifou, em 1929, 216 crianças abaixo de um anno, a gripe 173 e o sarampo 26. Ha as causas denominadas prenataes,