

possivel em 18 vezes o diagnostico positivo dentro de 24 horas após o recebimento das fezes suspeitas. Trinta e duas vezes esse resultado só foi dado pelo methodo classico; tratava-se nestes casos quasi sempre de bacillos oligo- ou inagglutinaveis. O methodo provou bem nos casos de typo Shiga, justamente aquelles que se beneficiam com o diagnostico precoce. De 161 exames, não incluindo aquelles que deram cultura negativa nas placas directamente, foi possivel em 130 ou 80 por cento das vezes dar o resultado dentro de 24 horas após a chegada do material ao laboratorio. Acredita o autor que, com o uso de séros agglutinantes bem especificos e potentes, possa o methodo ter applicação na pratica e prestar-se ainda a diagnostico em viagem ou em laboratorios regionaes. (Pacheco, G.: *Arch. Hyg.* 4: 115, 1930.)

Santa Casa de São Paulo

Movimento relativo ao anno de 1929 na Santa Casa da Misericórdia de São Paulo está representado pelos seguintes algarismos: Em tratamento a 1º de janeiro de 1929, 1,026 doentes; entraram durante o anno, 14,328; sahiram durante o anno, 12,819; falleceram durante o anno, 1,477; existiam em tratamento em 1º de janeiro de 1930, 1,098. Exames anatomo-pathologicos e outros, 21,729. Consultas: Medicina, 87,975; cirurgia, 14,088; gynecologia, 14,765; ophthalmologia, 10,751; oto-rhino-laringologia, 4,837; pelle, syphilis, 6,968. Pequenos curativos, 128,663; operações, 7,187. Formulas aviadas: Serviço interno, 247,133; serviço externo, 249,113; Hospital dos Lazaros, 4,274; Asylo de Invalidos, 7,802; Casa dos Expostos, 3,587. Falleceram 1,477 individuos, dos quaes 305 entraram moribundos e 302 falleceram de tuberculose. Percentagem da mortalidade na totalidade, 9.62. (*Gazeta Clinica*, dezembro, 1929.)

A Malaria no Exercito Brasileiro

No meio militar, as zonas de frequencia maxima da malaria são: valle do Amazonas, forte de Itaipú, limites do Estado de Matto Grosso com São Paulo, littoral do Paraná, principalmente na bahia de Paranaguá, Estados do Rio e da Bahia. Dado o habito dos anophelinios picarem somente durante a noite, os militares ficarão livres dessa infeção si tomarem precauções individuaes e collectivas contra o accesso do mosquito ao seu corpo durante o tempo que vae do pôr do sol ao nascer do dia. Sendo difficil a garantia absoluta contra a picada do mosquito, é aconselhavel, ainda hoje, o uso de pequenas doses diarias de quinina por quem se achar em zona palustre, como meio prophylactico. Como therapeutica de valor para jugular rapidamente os accessos palustres, tem sido empregada, com exito, pela commissão medico-militar na zona fronteiraça Brasil-Perú, o soluto iodo-durado do Dr. Regnaud. (Lobo, A.: *Folha Med.* 11:210 (jun. 25) 1930.)

A Lepra no Brasil

A lepra constitue um dos mais graves problemas da nosologia brasileira, exigindo, por isso, uma solução assim definitiva como urgente; num paiz como o Brasil se pode propor uma uniformidade de acção numa campanha contra a lepra, a solução devendo visar, preliminarmente, certas particularidades regionaes; o levantamento do censo é medida que inicialmente se impõe, para a organização de uma campanha perfeitamente orientada; tal serviço só deve ser confiado a quem estiver sufficientemente instruido em leprologia; leve-se em consideração que a lepra, em Brasil, é uma doença sobretudo rural; mostrando a epidemiologia da lepra que 50 por cento dos leprosos brasileiros se contaminaram antes dos 20 annos, havendo maior incidencia da doença a partir dos 5 annos, impõe-se um inquerito junto ás populações escolares nas regiões que apresentarem maior indice de infeção leprotica; numa campanha contra a lepra os dispensarios moveis podem prestar grandes serviços á autoridade encarregada do levantamento