

La Cause de L'Encéphalite et de la Poliomyélite Aiguë

Aldershoff,⁴ directeur de l'Institut sérologique de l'État néerlandais, expose le résultat de ses recherches: Les frottis de gorge de malades atteints d'encéphalite postvaccinale ou de poliomyélite aiguë décèlent des *Monilia*. La fréquence des *Monilia* est plus grande dans les familles où sévissent les deux affections sus-indiquées et surtout chez les infirmières qui soignent ces malades. Les *Monilia* sont pathogènes pour les lapins et les singes inférieurs. Aldershoff émet l'opinion que la *Monilia* pourrait être la cause connue de l'encéphalite postvaccinale, de la poliomyélite aiguë et peut-être d'autres affections aiguës du système central.

Le Cancer du Rectum

Un malade atteint de cancer rectal aborde le médecin, en lui disant:⁵ "Je crois avoir des hémorroïdes, car j'ai rendu un peu de sang," ou "je crois avoir de l'entérite, car j'ai rendu quelques glaires, ou bien j'ai senti quelques brûlures à l'intestin" ou encore "je dois avoir une fissure à l'anus, car j'ai présenté un suintement séro-purulent" ou enfin "je suis gêné au cours de la défécation." Un symptôme semblable suffit pour éveiller notre attention. Immédiatement, le médecin entourera la commissure de l'index d'un peu d'ouate, de façon à ne pas le salir dans le sillon inter-fessier. Huit fois sur dix, il découvre la tumeur. Si le doigt du clinicien ne rencontre pas un point induré, ou rétréci, ou végétant, le clinicien prend un rectoscope et complète l'examen; s'il n'a pas de rectoscope comme c'est la règle, il envoie le malade chez un spécialiste qui possède l'instrument et fait le diagnostic immédiat. Vous voyez donc que le diagnostic est facile à faire. Le cancer est-il opérable ou non? L'hésitation n'est guère possible, car pour être inopérable, il faut, en général, être atteint de métastase du foie ou du péritoine, ce qui est exceptionnel en cas de cancer rectal. Mais alors, l'état général est tellement modifié que l'hésitation n'est pas possible. Le cancer du rectum est une affection terrible, mais dont le pronostic est considérablement amélioré depuis ces dernières années. La mortalité est considérablement réduite. Les possibilités de conserver l'anus normal existe dans nombre de cas. Le malade obtient, avec l'amputation, une guérison définitive de 50 pour cent et des guérisons opératoires de 95 pour cent. Le pronostic d'un cancer rectal dépend avant tout du diagnostic posé par le premier médecin consulté. Celui-ci ne doit point quitter son malade sans que la décision thérapeutique soit prise.

Sur les œufs et leur conservation par le froid.—La production annuelle des œufs en France dépasse 5 milliards. Aux Etats-Unis, elle est d'environ 25 milliards. Chaque année, "la poule américaine" produit 1,250 millions de dollars, plus de 30 milliards de francs. Les statistiques de l'octroi établissent que la consommation annuelle des œufs à Paris s'est élevée à 780 millions en 1912 et 1913; qu'elle a diminué graduellement de 1921 à 1928, sans doute en raison de la cherté de cet aliment. Pour chacune des années 1927 et 1928, elle a été inférieure de 245 millions à celle de 1912 et 1913. La production des œufs est abondante de mars à juin avec minimum en avril (16 pour-cent) et très réduite d'octobre à janvier avec minimum en novembre (1.3 pour-cent); aussi, au printemps, conserve-t-on des œufs pour la période de pénurie. Seul, le froid—la réfrigération des œufs à +1° C. dans une atmosphère composée d'acide carbonique et d'azote—permet leur parfaite conservation. C'est le

⁴ Aldershoff: Gaz. Hôp. 103: 773 (mai 24), 1930.

⁵ Pauchet, V.: Gaz. Hôp., 508, 581, (av. 16), 1930.