Inauguration du Bureau de la Presse Médicale Latine

Grâce à l'appui généreux de la Chambre Syndicale des Fabricants de Produits Pharmacéutiques, la Fédération de la Presse Médicale Latine vient d'ouvrir à Paris (21 novembre 1929) un Bureau permanent de lecture et de renseignements, réalisant ainsi un des voeux formulés par son premier Congrès. Le Bureau est ouvert, à titre gracieux, à tous les médecins et étudiants en médecine, français et étrangers, demeurant à Paris ou de passage dans cette ville, sous la seule réserve de justifier de leur identité. Le Bureau est situé 101, rue de Richelieu.

La Leishmaniose Viscérale dans les Pays Méditerranéens

La leishmaniose viscérale est une maladie endémique des pays méditerranéens. En Espagne l'auteur [2] a signalé depuis 1912 plus de mille cas diagnostiqués au point de vue microbiologique par la ponction de la rate. Il a mis en lumière l'existence de foyers d'endémie dans les provinces de l'intérieur de l'Espagne et pas seulement dans le littoral. Plusieurs cas ont été observés chez l'adulte, le terme de kala-azar infantile ne doit donc pas être conservé. La pathogénie de la maladie répond à une véritable imprégnation parasitaire du système réticulo-endotélial. Nous possédons un traitement efficace (78 pour-cent de guérisons) dans les préparations d'antimoine. Mais le dépistage des malades doit être organisé au point de vue épidémiologique et prophylactique, en vue du diagnostic précoce.

Fièvre Typhoïde Contractée au Laboratoire

Achard [3] rapporte l'observation d'une femme employée dans un laboratoire à sceller des ampoules de vaccin antityphoïdique T. A. B. qui par erreur, n'avait pas été stériliseé. Ses doigts avaient été souillés et même aussi son visage par projection de gouttes d'émulsion microbienne. Deux jours après, elle éprouva les premiers malaises et elle s'alita, le cinquième jour. Elle eut une fièvre typhoïde régulière. L'hémoculture donna le bacille d'Eberth et l'agglutination se montra positive pour ce bacille d'abord, puis pour le bacille paratyphique, B, enfin pour le bacille A, alors que décroissait la séro-réaction pour le bacille d'Eberth. La brièveté de l'incubation permet de se demander si c'est bien la souillure par les cultures qui est la source de cette infection. Or un cas analogue de Duflocq et Roger Voisin montre qu'une fièvre typhoïde, contractée d'une façon en quelque sorte expérimentale par ingestion de culture, peut n'avoir qu'une incubation très courte, la malade s'étant alitée aussi le cinquième jour. Tirant de ce fait une conclusion pratique, Achard propose à l'Académie d'émettre le vœu que la vaccination préventive contre les maladies typoïde soit obligatoire pour toute personne employée dans les laboratoires publiques ou privés où sont manipulés les microbes de ces infections.

Vaccination Antirabique du Chien

La vaccination antirabique du chien a été très favorablement accueillie par les vétérinaires du Maroc, 264 chiens, vaccinés au moyen du virus-éther, ont été tenus en observation après l'inoculation, un laps de temps variant de 3 à 20 mois.[4] Aucun d'eux n'a pris la rage, qu'il ait été inoculé après morsure par des animaux enragés ou suspects (30 cas) ou que l'immunisation ait été faite sans morsure préalable (2 chiens, mordus après avoir été vaccinés, ont échappé à la maladie). La vaccination n'a donné lieu à aucun accident soit paralytique, soit toxique; le virus-éther est privé des propriétés nocives des antigènes cérébraux, dont les lipioïdes sont entraînés en grande partie par l'éther.

---

[2] Gaz. Hop. 102: 1733 (30 nov.) 1929.
[3] Progrès Méd. 56: 2064 (nov. 23) 1929.
[4] Lafont, J.: Progrès Méd. 56: 2116 (30 nov.) 1929.