

cocos. As injeções são diárias, feitas pela manhã. O soluto empregado é de 2 por cento, ampoulas de 5 c. c. tendo portanto, 0. 1 de sal, são feitas no paciente sentado, aspirando-se previamente 2 a 3 c. c. des angue e injectadas lentamente. As reacções observadas são mínimas, 15 por cento. Não houve uma só grave, nem mesmo alarmante, predominando as gastro-intestinaes e cardiacas. O auctor emprega systematicamente, no seu serviço de urologia do H. C. E., a trypaflavina, por consideral-a o melhor tratamento chimiotherapico da urethrite aguda; e por ter dado maiores porcentagens de cura em menor espaço de tempo.

#### A Saude da Policia Brasileira

A tuberculose causa annualmente a média de 50 obitos nas praças da Policia Militar do Río e o afastamento do serviço activo, pela necessidade da hospitalização e do licenciamento de nada menos de 190 praças, por anno.<sup>4</sup> Quanto á mortalidade por esta doença dever-se-ha notar que mais de metade das praças, que são licenciadas por um anno, não tem sobrevida superior a esse prazo de tempo. Basta lembrar que 258 praças foram licenciadas por um anno no periodo de 1920 a 1926 e desse numero sómente 82 foram reformadas, deixando as outras de obter a reforma por haverem fallecido antes de se esgottar o prazo de um anno de respectivo licenciamento. As doenças venereas e a syphilis obrigam á permanencia no hospital e ao licenciamento de 576 praças por anno. Em menor escala, avultam as verminoses, cujo combate systematico e intensivo, iniciado em 18 de julho de 1921, foi suspenso em 29 de junho de 1922 por falta de profissional, para attender a este serviço. No entanto, os dados estatisticos colligidos em 745 praças examinadas e tratadas rigorosamente, deram margem ás seguintes observações: indice de infectação por parasitas intestinaes, 77 por cento; média de infestados pelo *Necator americanus* e portanto de opilados, 41 por cento; média de infestados por *Bilharzia hematobia*, 7 por cento; média de praças com anemia benigna, 8 por cento. Nas praças com hemoglobina abaixo de 60 por cento deve ser feito o tratamento intensivo contra verminoses. O indice de robustez no soldado brasileiro não serve para definir a aptidão ou incapacidade para o serviço militar; 73 por cento das praças obtiveram melhoramento do indice de robustez após o tratamento contra verminoses. Victimado pela tuberculose pulmonar morre por semana um soldado de policia, pela mesma molestia são hospitalizados e licenciados annualmente nada menos de 190 soldados; 576 baixam annualmente ao hospital accommettidos de doenças venereas ou victimas de syphilis e 77 por cento estão infestados por parasitas intestinaes, dos quaes 41 por cento são opilados.

#### Causas da Mortalidade Infantil num Districto de São Paulo

No inquerito feito por Figueira de Mello <sup>5</sup> no districto do Bom Retiro de São Paulo, para verificação das causas da mortalidad infantil, verificou o coefficiente de 120 obitos infantis para 1,000 nascimentos em 1928, quando o coefficiente geral, da cidade, foi de 160 por 1,000 nascimentos. Á influencia do centro de saude, atribue a baixa de 40 obitos por 1,000 nascimentos. Coube aos disturbios digestivos em 180 creanças que já completaram 1 anno de idade, o primeiro logar como causa mortis, com a porcentagem de 14.81. Seguem-se immediatamente, as affecções agudas broncho-pneumonicas, com a porcentagem de 11.11 e em segundo logar debilidade congenita. Pela distribuição da idade, os obitos occorridos de fevereiro de 1928 a maio de 1929, constataam a maior porcentagem na idade de 1 a 2 mezes, attingindo a porcentagem 18.51; de 2 a 3 mezes, 11.11; de 3 a 4 mezes, 7.40; subindo novamente a 11.11 de 5 a 6 mezes, época geral do

<sup>4</sup> Rezende, M: Arch. Bras. Med. 19: 490 (sbro.) 1929.

<sup>5</sup> Figueira de Mello, F.: Inquerito Sobre a Mortalidade Infantil, apresentado ao 5º Congresso Brasileiro de Hygiene reunido em Recife.