

Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados en la Región de las Américas hasta el 31 de marzo de 1982.

País y división administrativa principal	Cólera Casos	Fiebre amarilla		Peste Casos
		Casos	Defunciones	
BOLIVIA	-	83	28	-
Cochabamba	-	2	-	-
Santa Cruz	-	81	28	-
BRASIL	-	12	12	16
Ceará	-	-	-	16
Mato Grosso do Sul	-	12	12	-
ESTADOS UNIDOS	1 ^a	-	-	2
Arizona	-	-	-	1
California	1 ^a	-	-	-
Texas	-	-	-	1

^aImportado.

- Ninguno.

Tuberculosis en los Estados Unidos y Canadá, 1980¹

En 1980, se notificaron en los Estados Unidos un total de 27.749 casos de tuberculosis. Esta cifra representa un aumento de 80 casos (0,3%) desde 1979, el segundo que se registra desde 1953. La tasa en 1980 fue de 12,3 casos por 100.000 habitantes (un 2,4% menos que en 1979), lo que indica una estabilización de la tendencia a la baja (5% anual) registrada durante los últimos 26 años. Esta atenuación del descenso de la tasa de incidencia se ha venido observando en los últimos tres años.

En Canadá, las cifras para 1980 arrojan un total de 2.841 casos notificados de tuberculosis, indicativos de un aumento general de 44 casos con relación a las cifras de 1979. La tasa de 11,9 por 100.000 habitantes revela una atenuación del descenso experimentado desde 1970, si se compara con la tasa de 1979 (11,8).

El factor que ha frenado la tendencia a la baja en las tasas anuales de ambos países ha sido la alta prevalencia de tuberculosis en los numerosos inmigrantes indochinos admitidos en los últimos años. Se trata de un fenómeno interesante, que demuestra la importancia de un grupo especial de población (los inmigrantes) para la epidemiología de la tuberculosis en el país de acogida.

En Canadá, los grupos de inmigrantes contribuyeron en un 38% (1.085) al número de casos notificados en 1980. En ese año se diagnosticaron en total 369 casos de tuberculosis entre los que habían inmigrado a Canadá durante 1979 y 1980, lo que representa un 34% del total de casos para el año; de esas personas, 291 eran de origen asiático.

Los programas estatales de control de la tuberculosis en los Estados Unidos informaron que 3.895 refugiados indochinos recibieron tratamiento para esta enfermedad en 1979 y 1980. La prevalencia aproximada de tuberculosis en ese grupo de población se calcula en 1.138 casos por 100.000 personas en el momento de entrada, mientras que la incidencia anual con ulterioridad a la llegada entre

¹Para información más completa sobre la epidemiología y el control de la tuberculosis en las Américas, véase OPS, *Boletín Epidemiológico*, 2:5, 6, 1981.