

Resumen de la situación del cólera en la Región

En **Cuba**, entre la semana epidemiológica (SE) 27 del 2012 y la SE 34 del 2013, se registraron 678 casos de cólera incluyendo tres defunciones. No se han reportado nuevos casos desde el 24 de agosto de 2013.

En **Haití**, desde el inicio de la epidemia (octubre 2010) y hasta la SE 47 del 2013, se registraron 692.098 casos de cólera, de los cuales 386.652 fueron hospitalizados (55,9%) y 8.470 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada continua siendo de 1,2%, con variaciones que oscilan entre el 4,4% en el departamento de Sud Est al 0,6% en Port-au-Prince.

Durante 2013, en promedio se han registrado 1.120 casos y 9 defunciones por semana y en las últimas cuatro semanas se observa una tendencia creciente en el número de casos, lo cual coincide con la temporada de lluvias, tal como observado el año anterior. El promedio de casos y defunciones del 2013 es menor en comparación a lo que se registró semanalmente en 2011 (6.730 casos y 56 defunciones) y en 2012 (1.945 casos y 18 defunciones) respectivamente.

En **México**, desde la SE 37 a la SE 47 del 2013 se registraron 184 casos de infección por *Vibrio cholerae* O:1 Ogawa toxigénico, incluido un fallecimiento. De los casos, 94 fueron mujeres y 90 fueron hombres. Del total de casos confirmados, dos son residentes del Distrito Federal, 160 del estado de Hidalgo, 9 del estado de México, dos del estado de San Luis Potosi y 11 del estado de Veracruz.

Desde la SE 40 del 2013 se registra un descenso en el número de casos confirmados.


En **República Dominicana**, desde el inicio de la epidemia (noviembre del 2010) y hasta la SE 46 de 2013, se registraron un total de 31.220 casos sospechosos de cólera, de los cuales 462 fallecieron. Entre la SE 45 y la SE 46 del 2013 fueron reportados 14 casos sospechosos de cólera y no se registraron defunciones. En este periodo, 12 de las 32 provincias del país registraron casos sospechosos de cólera. En las últimas cuatro semanas, las provincias que concentran el 88% de los casos sospechosos fueron Azua, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo y La Vega.

Desde la SE 43 del 2013, se observa un incremento en el número de casos, el cual coincide con la temporada de lluvias en la Española. La tasa de letalidad registrada en 2013 es de 2,2%, la cual es superior a la registrada durante 2011 (1,7%) y 2012 (0,8%).

Recomendaciones

Continúan vigentes las recomendaciones formuladas en la [Alerta Epidemiológica](#) del 2 de noviembre del 2012.

Figura. Casos acumulados de cólera en la Región de las Américas hasta la semana epidemiológica 47 del 2013.



Elaboración: Organización Panamericana de la Salud. Fuentes de datos descritas en la figura.

Referencias

1. Ministère de la Santé Public et de la Population. Rapports journaliers du MSPP, Haiti, 2013. Disponible en: <http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php?page=1¶m1=valu1¶m2=value2>
2. Boletín Epidemiológico de República Dominicana. Semana Epidemiológica 46, 2013. Disponible en: http://digepisalud.gob.do/boletines/otras-publicaciones/cat_view/33-otras-publicaciones/63-boletines-semanales.html

Enlaces de utilidad:

- Información sobre la declaración de la OMS en relación con los viajes y el comercio internacionales hacia y desde los países que están registrando cólera:
<http://www.who.int/cholera/technical/prevention/cholera-travel-and-trade-advice-231110.pdf>
- Información sobre cólera de la OMS:
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html>
- Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en:
www.paho.org/colera