

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN
DE LA COMPETENCIA

**GARANTIZAR LA COMPETENCIA
DE LOS PRESTADORES DE ATENCIÓN
DIRECTA EN LA APLICACIÓN
DE LA INICIATIVA HOSPITAL
AMIGO DEL NIÑO**

ANEXO A

**FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
(ORDENADO POR DOMINIO Y COMPETENCIA)**

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS Américas

Versión oficial en español de la obra original en inglés
*Competency verification toolkit: ensuring competency of direct care providers
to implement the Baby-friendly Hospital Initiative:
Web annex A: competency verification form (sorted by domain and competency)*
© Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020
ISBN: 978-92-4-000935-6 (versión electrónica)

Conjunto de herramientas de verificación de la competencia. Garantizar la competencia de los prestadores de atención directa en la aplicación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño: Anexo A. Formulario de verificación de competencias (ordenado por dominio y competencia)

ISBN: 978-92-75-32828-6 (PDF)

© **Organización Panamericana de la Salud, 2024**

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
DOMINIO 1: PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN FUNDAMENTALES PARA APOYAR LOS DIEZ PASOS			
Competencia 1. Aplicar el Código en un establecimiento de salud			
1. Enumerar al menos 3 productos que cubra el Código.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sucedáneos de la leche materna (incluidas las preparaciones para lactantes, es decir, cualquier preparación o leche para lactantes [o productos que podrían utilizarse para sustituir a la leche materna] que se comercializan específicamente para la alimentación de lactantes y niños pequeños de hasta 3 años, incluidas las preparaciones para lactantes con necesidades especiales, y leches artificiales de seguimiento y de crecimiento). ✓ Otros alimentos y bebidas que se promocionan como adecuados para alimentar al bebé durante los seis primeros meses de vida, cuando se recomienda la lactancia materna exclusiva. Esto incluiría infusiones para bebés, zumos y agua. ✓ Biberones y tetinas. 			
2. Describir al menos 3 formas en que un prestador de atención directa protege la lactancia materna en la práctica.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por si acaso, evitar dar a la madre muestras de preparaciones para lactantes. ✓ Evitar ofrecer preparaciones para lactantes en las primeras horas después del nacimiento. ✓ Evitar decirle a una madre que ella no produce suficiente leche sin realizar antes una evaluación exhaustiva de la lactancia materna. ✓ Explicar a la madre el efecto negativo de introducir la alimentación parcial con biberón (alimentación mixta). ✓ Explicar a la madre las implicaciones sociales y económicas de las preparaciones para lactantes. ✓ Evitar el uso en el establecimiento de atención de salud de imágenes, carteles, diagramas, etc., con bebés amamantados que hayan producido o distribuido empresas cuyos productos estén incluidos en el Código. 			
3. Describir al menos 1 forma en que un prestador de atención directa debe responder si se le ofrece información proporcionada por fabricantes o distribuidores de productos incluidos en el ámbito del Código.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aceptar solo información científica y basada en los hechos. ✓ Asegurarse de que la información está libre de intereses comerciales. ✓ Rechazar la información que promueva un interés comercial. ✓ Comprobar que toda la información afirme la superioridad de la lactancia materna. ✓ Asegurarse de que la información no indica una equivalencia entre la lactancia materna y un sucedáneo de la leche materna. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
4. Describir al menos 1 tipo de incentivo financiero o material que un fabricante o un distribuidor de productos incluidos en el ámbito del Código podrían ofrecer a un prestador de atención directa.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Artículos promocionales (por ejemplo, bolígrafos, blocs de notas, tazas de café, cintas métricas, carteles con el logotipo de la empresa, alfombrillas para el ratón, portaidentificaciones). ✓ Comidas gratuitas. ✓ Seminarios gratuitos con o sin créditos de formación continua. ✓ Becas, subvenciones, honorarios. ✓ Muestras o productos gratuitos para uso personal o distribución a pacientes, embarazadas, madres de bebés y niños pequeños o miembros de sus familias. 			
5. Describir al menos 1 perjuicio que puede producirse si un prestador de atención directa acepta incentivos financieros o materiales.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apariencia de que se avala el producto. ✓ Posible obligación de favorecer los productos de esa empresa en detrimento de otros productos. ✓ Conflicto ético de intereses como prestador de atención directa. ✓ Puede estar sutilmente influido por el incentivo y comprometer sin querer la lactancia materna. 			
6. Explicar al menos 2 formas por las que el establecimiento se asegura de que no se promocionen preparaciones para lactantes, biberones o tetinas en ninguna parte del establecimiento donde se presten servicios de maternidad y neonatología, ni por parte de ninguno de los prestadores de atención directa.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ No hay carteles ni materiales educativos con imágenes de bebés alimentados con biberón. ✓ Hay imágenes y carteles con bebés tomando el pecho. ✓ Los productos contemplados en el Código se mantienen fuera de la vista de los padres. ✓ No se entrega material escrito o en formato electrónico de las empresas de productos de alimentación infantil a los padres o los futuros padres. ✓ Alguna persona del centro tiene la obligación de inspeccionar con regularidad los materiales que los padres podrían ver, por ejemplo, en las salas de espera o en una tienda situada en el establecimiento de atención de salud. ✓ No se dan a las madres productos contemplados en el Código. ✓ Los representantes de las empresas de productos de alimentación infantil no deben buscar contacto directo o indirecto de ningún tipo con las madres y las familias en el hospital. 			
Competencia 2. Explicar las políticas de alimentación del lactante y los sistemas de seguimiento del establecimiento			
7. Describir al menos 2 elementos de la política de alimentación del lactante del establecimiento.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los diez pasos. ✓ El Código. ✓ Apoyo a todas las madres, incluidas las que deciden no amamantar. ✓ Cómo vigila el establecimiento el progreso hacia los diez pasos. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
8. Explicar al menos 3 formas en las que la política de alimentación del lactante afecta al trabajo de un prestador de atención directa en este establecimiento.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La política impulsa la práctica. ✓ Cumplimiento obligatorio del Código. ✓ Práctica según los diez pasos. ✓ Informar a todos (personal, padres, público en general) sobre la política. ✓ Saber dónde se puede obtener una copia de la política. ✓ Se presta apoyo a las embarazadas y a las madres para que tomen decisiones fundadas sobre la alimentación de los lactantes. ✓ En el establecimiento se hace un seguimiento de las prácticas. 			
9. Explicar al menos 2 motivos por los que el seguimiento de las prácticas hospitalarias es importante para garantizar la calidad de la atención.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar dónde no se cumplen las normas para facilitar la aplicación correcta de las prácticas. ✓ Afecta a todas las personas del establecimiento. ✓ Evaluar los avances en la aplicación de las prácticas basadas en la evidencia. ✓ Utilizarlo como incentivo para la consecución de las metas. 			
10. Explicar al menos 2 formas de hacer el seguimiento de las prácticas en este establecimiento.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auditorías periódicas, que incluyan la verificación de la competencia. ✓ Las tasas de inicio y exclusividad de la lactancia materna se recogen, compilan y comparten con todos los implicados. ✓ Se hace el seguimiento del uso de suplementos y las justificaciones. ✓ Cada etapa tiene elementos específicos que se someten a seguimiento y se comunican regular o periódicamente. 			
DOMINIO 2: HABILIDADES BÁSICAS: COMUNICAR DE FORMA CREÍBLE Y EFICAZ			
Competencia 3. Utilizar las habilidades de escucha y aprendizaje cuando se entabla una conversación con una madre			
11. Mostrar al menos 3 aspectos de las habilidades de escucha y aprendizaje al hablar con una madre.	Observación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hacer preguntas abiertas. ✓ Utilizar respuestas y gestos que muestren interés (sonreír, asentir con la cabeza, etc.). ✓ Parfrasear lo que dice la madre. ✓ Empatizar: expresar de una manera culturalmente adecuada que entiende cómo se siente la madre. ✓ Evitar las palabras que suenen a crítica (bueno, malo, normal, incorrecto). 			
12. Mostrar al menos 3 formas de adaptar el estilo y el contenido de la comunicación al hablar con una madre.	Observación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizar una comunicación no verbal eficaz (sentarse con la madre, evitar cruzar los brazos, utilizar o evitar el contacto visual según sea culturalmente apropiado, etc.). 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Responder a los obstáculos particulares a los que se enfrenta la madre. ✓ Utilizar la sensibilidad y el cuidado para abordar los retos a los que quizá se esté enfrentando la madre. ✓ Responder a las necesidades, preferencias y valores de las madres y las familias. 			
Competencia 4. Utilizar las habilidades para dar confianza y apoyo al entablar una conversación con una madre			
13. Mostrar al menos 2 formas de animar a una madre a compartir sus puntos de vista, tomándose el tiempo necesario para entenderlos y tenerlos en cuenta.	Observación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dar tiempo a la madre para que explique sus preocupaciones, con el fin de tener claro en qué hay que hacer hincapié. ✓ Reconocer lo que ella piensa y siente. ✓ Responder a sus preocupaciones con información objetiva proporcionada de manera sensible y respetuosa. ✓ Ayudarla a identificar soluciones viables que respondan a sus preocupaciones y circunstancias específicas. 			
14. Describir al menos 3 aspectos que son útiles para dar confianza y apoyo al hablar con una madre.	Observación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Averiguar con respeto qué sabe la madre. ✓ Reconocer y afirmar lo que va bien en la pareja madre-lactante. ✓ Ofrecer retroalimentación positiva y apoyo emocional para favorecer la confianza y la autoeficacia de las madres en la lactancia materna. ✓ Determinar con la madre lo que hay que mejorar. ✓ Permitir que la madre alcance sus objetivos de lactancia materna. ✓ Dar ayuda práctica. 			
DOMINIO 3: PERÍODO PRENATAL			
Competencia 5. Entablar una conversación prenatal sobre la lactancia materna			
15. Entablar una conversación con una embarazada sobre 3 aspectos de la importancia de la lactancia materna.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recomendaciones mundiales sobre el inicio temprano de la lactancia materna y del contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé inmediatamente después del nacimiento y durante al menos una hora. ✓ Recomendaciones mundiales sobre la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. ✓ Recomendaciones mundiales sobre la lactancia materna hasta los 2 años de edad o más. ✓ Riesgos de no adoptar la lactancia materna para la madre y el bebé. <u>Para el bebé:</u> ✓ La microbiota de los bebés no alimentados con leche materna exclusivamente es diferente a la de los alimentados solo con leche materna. ✓ La suplementación con leche artificial altera significativamente la microflora intestinal. ✓ Mayor riesgo de: <ul style="list-style-type: none"> – Enfermedades agudas (infecciones respiratorias, diarreas, otitis, dermatitis). 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> – Alergias e infecciones. – Enfermedades crónicas (asma, diabetes, obesidad). – Cánceres durante la infancia, leucemia. – Muerte antes de los 2 años de edad por todas las causas. – Enterocolitis necrotizante. – Síndrome de muerte súbita del lactante. – Reducción del desarrollo cognitivo. <p><u>Para la madre, utilizar preparaciones para lactantes implica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ofrecer suplementos innecesarios puede poner en peligro la producción adecuada de leche. ✓ Mayor riesgo de: <ul style="list-style-type: none"> – Depresión posnatal. – Cáncer de mama. – Cáncer de ovario. – Hipertensión. – Diabetes de tipo 2. 			
<p>16. Evaluar al menos 3 aspectos de los conocimientos de una embarazada sobre la lactancia materna para subsanar las deficiencias y corregir las inexactitudes.</p>	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar información adicional sobre la lactancia materna de acuerdo con las necesidades y preocupaciones de la embarazada, que incluya lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ventajas de la lactancia materna exclusiva; – cómo iniciar y establecer la lactancia materna después del parto; – importancia del contacto directo, piel con piel, entre la madre y el bebé inmediatamente después del nacimiento; – patrones de lactancia materna típicos; – alimentación perceptiva y signos de hambre; – alojamiento conjunto de la madre y el bebé; – importancia del calostro; – prácticas de atención de salud y ayuda que recibirá la madre después del parto. <p>Apoyar de forma respetuosa a una mujer que quizá no se plantee la lactancia materna, para que tome una decisión fundamentada sobre la alimentación de su hijo.</p>			
<p>17. Entablar una conversación con una embarazada sobre al menos 4 prácticas de atención que la pareja madre-lactante tendrán en el servicio de obstetricia y que favorecerán la lactancia materna.</p>	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Importancia de una experiencia de parto positiva. ✓ Contacto directo, inmediato e ininterrumpido, piel con piel, de la madre con el bebé. ✓ Inicio de la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento. ✓ Reconocimiento de los signos de hambre. ✓ Respuesta rápida a los signos de hambre. ✓ Fundamentos de una buena posición y un buen agarre. ✓ Cómo funciona la lactancia materna. ✓ Extracción de la leche materna (por qué, cómo, práctica del contacto con el pecho, familiarización con el masaje, etc.). 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
DOMINIO 4: NACIMIENTO Y POSPARTO INMEDIATO			
Competencia 6. Poner en práctica el contacto directo, inmediato e ininterrumpido, piel con piel, de la madre con el bebé			
18. Explicar al menos 3 razones por las que es importante para la madre el contacto directo, inmediato e ininterrumpido, piel con piel, con el bebé.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temperatura dentro de los límites normales. ✓ La placenta se expulsa puntualmente tras la oleada de oxitocina materna, por lo que hay menos anemia posnatal. ✓ Aumento de la oxitocina que provoca una involución uterina adecuada, garantizando la producción de leche. ✓ La gastrina sérica se mantiene baja, lo que significa menos estrés para la madre. ✓ La lactancia materna se facilita debido a las hormonas que intervienen en el contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé. ✓ Se facilita el establecimiento del vínculo afectivo (contactos visuales, posición de contacto visual frontal, comportamientos afectuosos). ✓ La voz y los movimientos de la madre son suaves, ella muestra paciencia en sus intentos de que el bebé se agarre al pecho o de estimularlo. ✓ Sensación materna de bienestar (la oxitocina y las endorfinas aumentan). ✓ Menos síntomas depresivos posnatales. ✓ Menos negligencia y abandono del bebé por parte de la madre. ✓ Reciprocidad mutua; la sensibilidad materna aumenta. ✓ La madre puede calmar a su bebé más fácilmente. 			
19. Explicar al menos 3 razones por las que es importante para el bebé el contacto directo, inmediato e ininterrumpido, piel con piel, con la madre.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La flora materna coloniza la microbiota del bebé. ✓ La temperatura se mantiene dentro de los límites normales. ✓ La oxigenación y los gases arteriales se mantienen dentro de los límites normales. ✓ La frecuencia cardíaca se mantiene dentro de los límites normales y la taquicardia inicial se reduce poco después del nacimiento. ✓ Disminuye el estrés del nacimiento (la gastrina plasmática se mantiene baja). ✓ La glucemia se mantiene dentro de los límites normales. ✓ La concentración de cortisol es baja, lo que favorece los comportamientos de bajo estrés después del nacimiento y previos a la alimentación. ✓ Se promueve la organización neuromotora normal. ✓ La lactancia materna se ve facilitada por la oleada hormonal, la proximidad al pecho (olores, masaje del pecho con los puños del bebé, colocación de la lengua) y la facilidad para pasar por las 9 etapas instintivas (comportamientos previos a la alimentación que dan lugar a la producción adecuada de leche, succiones eficaces, exclusividad y transición suave hacia la lactancia materna). ✓ La pérdida y el aumento de peso iniciales están dentro de los límites normales en el período posnatal temprano. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reducción del dolor durante procedimientos dolorosos como la punción del talón y las inyecciones intramusculares. ✓ El bebé no está estresado (llora menos después del llanto inicial). ✓ Se facilita el establecimiento del vínculo afectivo (contactos visuales, posición de contacto visual frontal, estado de alerta, vocalizaciones, calma). 			
<p>20. Mostrar al menos 3 puntos acerca de cómo se realiza sistemáticamente el contacto inmediato, ininterrumpido y seguro, piel con piel, de la madre con el bebé, con independencia del método de nacimiento.</p>	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ De inmediato, se coloca al bebé desnudo, boca abajo, sobre el pecho desnudo de la madre y no se le coloca bajo la plataforma calentadora ni en otro lugar antes de que tenga lugar este contacto. ✓ No se seca al bebé antes de colocarlo sobre la madre. Cuando se ha puesto al bebé en contacto directo, piel con piel, con la madre, se secan bien la cabeza y la espalda para evitar la evaporación. ✓ Es válido para los partos vaginales o las cesáreas con anestesia regional. ✓ Se evalúa al bebé mientras está sobre su madre, ya que el contacto piel con piel reducirá el estrés del bebé debido al nacimiento. ✓ La estabilidad del bebé (por ejemplo, ausencia de apnea, desaturación o bradicardia) se evalúa después de colocarlo sobre la madre. 			
<p>21. Mostrar al menos 3 aspectos de seguridad que se deben valorar cuando la madre y el bebé están en contacto directo, piel con piel, durante las 2 horas siguientes al parto, con independencia del método de nacimiento.</p>	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Observación del recién nacido (color, respiración, movimiento libre de la cabeza y el tórax). ✓ Observación de la madre (bienestar, estado de alerta, nivel de dolor). ✓ Describir a los padres qué deben observar y con quién deben ponerse en contacto. ✓ La observación la realiza con regularidad un profesional de atención de salud designado de acuerdo con un procedimiento escrito (puede denominarse política, protocolo, procedimiento o directriz). ✓ Apoyo del bebé, en caso de cesárea, para evitar caídas. 			
<p>22. Enumerar al menos 3 razones por las que NO se debe interrumpir el contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé.</p>	Pregunta o estudio de caso		
<p>Si se interrumpe el contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La secreción hormonal de oxitocina y endorfinas tiene que reanudarse más adelante. ✓ El cortisol del bebé será más alto, lo que indica un mayor nivel de estrés. ✓ La temperatura no se mantiene dentro de los límites normales, especialmente si la temperatura ambiente de la habitación es fría, lo que afectará a la glucemia (concentración de glucosa en sangre) del bebé. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Existe el riesgo de que el microbioma se “contamine” con gérmenes que no sean los de la madre. ✓ La secuencia innata humana del recién nacido (comportamientos instintivos previos a la alimentación) se verá afectada. ✓ Habrá un retraso en la realización de este proceso innato (comportamientos instintivos previos a la alimentación). 			
23. Explicar al menos 2 razones por las que se podría interrumpir el contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé por motivos médicamente justificados.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Existe un problema médico crítico. ✓ La madre no se encuentra bien (desmayos, mareos, etc.). ✓ El bebé está inestable según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) (por ejemplo, apnea, desaturación y bradicardia). ✓ Si ha sido necesario retrasar o interrumpir el contacto directo temprano, piel con piel, de la madre con el bebé, hay que asegurarse de que este contacto piel con piel tenga lugar tan pronto como sea clínicamente posible. ✓ Todo lo anterior debe explicarse en la historia clínica. 			
24. *CUANDO PROCEDA* Explicar cómo mantener el contacto directo, piel con piel, de la madre con el bebé durante el traslado de ambos a otra habitación u otra zona de recuperación.	Pregunta o estudio de caso		
<p>OPCIÓN 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener al bebé en contacto directo, piel con piel, con la madre, cubierto con una manta seca. 2. Asegurarse de que el bebé está seguro. <p>OPCIÓN 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colocar al bebé en contacto directo, piel con piel, sobre la persona de apoyo, cubierto con una manta seca. 2. Volver a poner al bebé en contacto directo, piel con piel, con la madre cuando esta pueda hacerlo. 			
Competencia 7. Facilitar la lactancia materna en la primera hora, según los signos de hambre del bebé			
25. Entablar una conversación con una madre sobre al menos 3 razones por las que es importante la succión del pecho en las primeras horas, cuando el bebé esté preparado.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar las razones por las que es importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desencadena la producción de leche materna. ✓ Facilita el progreso de la lactogénesis. ✓ Aumenta las contracciones uterinas. ✓ Reduce el riesgo de mortalidad infantil. ✓ La madre aprende a reconocer los signos de hambre y el agarre eficaz del bebé. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
26. Mostrar al menos 3 aspectos de la atención segura del recién nacido en las 2 horas posteriores al parto.	Observación		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La madre está semirrecostada (se debe elevar la cabecera de la cama o la camilla de la madre a 30 grados o más para evitar que el bebé esté en decúbito prono). ✓ Colocar al recién nacido sobre la madre para facilitar el contacto visual y el reconocimiento de los signos de despertar y de hambre del bebé por parte de la madre. ✓ Comprobar si el bebé puede levantar la cabeza espontáneamente en todo momento, para facilitar la respiración óptima y la primera succión. ✓ Comprobar visualmente la respiración, el color y la capacidad de respuesta a la estimulación del bebé cuando se evalúan las constantes vitales de la madre y sin retirar la manta, para evitar que disminuya la temperatura. ✓ Asegurarse de que la nariz y la boca del bebé estén visibles en todo momento. ✓ Comprobar la capacidad de respuesta de la madre. ✓ Confirmar que tanto la madre como la persona de apoyo saben qué deben evaluar y cómo obtener ayuda si la necesitan. 			
27. Describir a una madre al menos 3 comportamientos previos a la alimentación que el bebé muestra antes de succionar activamente del pecho.	Observación		
<p>Entre los comportamientos previos a la alimentación del bebé se encuentran los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ hace un descanso breve en estado de alerta para adaptarse al nuevo entorno; ✓ se lleva las manos a la boca y hace movimientos y sonidos de succión; ✓ toca el pezón con la mano; ✓ se centra en la areola de la mama, que actúa como una diana; ✓ se mueve hacia el pecho y se vuelve (rotación) en busca del pecho; ✓ encuentra la zona del pezón y se agarra con la boca bien abierta. 			
DOMINIO 5: TEMAS ESENCIALES PARA UNA MADRE QUE AMAMANTA			
Competencia 8. Comentar con una madre cómo funciona la lactancia materna			
28. Describir al menos 6 temas esenciales que toda madre que amamanta debe conocer o mostrar.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. ✓ Contacto visual y corporal entre la madre y el bebé durante la toma. ✓ Signos de hambre y de un agarre adecuado, deglución, transferencia de leche y satisfacción del bebé y cómo reconocerlos todos. ✓ Frecuencia de alimentación promedio (al menos 8 veces cada 24 horas), aunque algunos bebés necesitan tomas más frecuentes. ✓ Cómo amamantar en una posición cómoda y sin dolor. ✓ Se debe alimentar a los bebés en respuesta a los signos de hambre, se les ofrecen ambos pechos en cada toma y se los alimenta hasta que parezcan satisfechos. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cómo lograr o mejorar la producción y la eyección de la leche. ✓ Por qué extraer manualmente el calostro o la leche materna y cómo hacerlo. ✓ Cómo utilizar y cuidar correctamente el sacaleches (en el caso de las madres que necesiten un sacaleches, o extractor). ✓ Efectos de los chupetes y las tetinas artificiales en la lactancia materna y por qué se deben evitar hasta que se establezca la lactación. ✓ Muy pocos medicamentos o enfermedades de la madre suponen una contraindicación para la lactancia materna. ✓ Recursos de información precisa. ✓ Razones para que una madre lactante evite el tabaco, el alcohol y otras drogas. ✓ Instrucciones para dormir con seguridad (cómo hacer más seguro el colecho o cama compartida). ✓ Reconocer los signos de ingesta insuficiente o deshidratación en el lactante y las señales de alerta para solicitar la atención de un profesional de la salud que sabe manejar las dificultades más comunes de la lactancia materna. 			
<p>29. Entablar una conversación con una madre sobre al menos 3 razones por las que es importante la lactancia materna exclusiva eficaz.</p>	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para abordar la importancia de que la lactancia materna sea exclusiva:</p> <p><u>Para el bebé:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El bebé aprenderá a mamar más rápido. ✓ El bebé aprenderá a autorregular la ingesta de leche. ✓ Proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo físico y neurológico. ✓ Los efectos de la lactancia materna son mayores cuando es exclusiva. ✓ El calostro es rico en factores de protección. ✓ La microbiota (flora intestinal) de los bebés no alimentados exclusivamente con leche materna es diferente a la de los alimentados solo con leche materna. ✓ Incluso una sola dosis de una preparación para lactantes cambia la microbiota. <p><u>Para la madre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La lactancia materna frecuente y exclusiva ayuda a aumentar la producción de leche de la madre. ✓ Menos riesgo de congestión. ✓ Debido al vaciamiento regular, la madre siente menos molestias mamarias. 			
<p>30. Entablar una conversación con una madre sobre 2 elementos relacionados con los patrones de alimentación del bebé en las 36 primeras horas de vida.</p>	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para explicar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La frecuencia mínima de alimentación es de 8 veces cada 24 horas. ✓ Las tomas agrupadas (muchas tomas muy seguidas, en función de los signos de hambre) son frecuentes y normales en las primeras 24-36 horas y no indican que el suministro de leche sea inadecuado. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
31. Describir a una madre al menos 4 signos de la transferencia adecuada de leche en los primeros días.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para explicar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El bebé succiona el pecho de manera regular y rítmica, con pausas ocasionales. ✓ Se ve o se oye la deglución rítmica. ✓ El bebé no hace chasquidos al alimentarse. ✓ Las mamas pueden estar más blandas después de las tomas y recuperar su plenitud entre ellas. ✓ Aumenta progresivamente la producción de orina hasta por lo menos cuatro pañales muy mojados al día; la orina es de color amarillo claro. ✓ El número de deposiciones aumenta progresivamente después del primer día. ✓ Las heces pasan de ser meconiales (oscuras) a amarillentas. ✓ El bebé parece satisfecho, no llora. ✓ El peso se estabiliza al cuarto día. 			
Competencia 9. Ayudar a una madre a conseguir que su bebé se agarre al pecho			
32. Evaluar una sesión completa de lactancia materna observando al menos 5 puntos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para evaluar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El bebé es capaz de agarrarse al pecho y extraer la leche. ✓ El bebé presenta movimientos de succión rítmicos con pausas breves. ✓ El bebé suelta la mama al final de la toma, y muestra señales de saciedad. ✓ Los comportamientos son similares si el bebé mama del otro pecho. ✓ La mano de la madre sostiene el cuello y los hombros del bebé, sin empujar su cabeza hacia la mama. ✓ La madre vela por la estabilidad postural del bebé. ✓ Después de la toma, las mamas y los pezones están intactos y no molestan. ✓ La madre afirma que no le duelen las mamas ni los pezones. ✓ Signos y síntomas que podrían requerir valoración y seguimiento adicionales según la evaluación. 			
33. Mostrar al menos 3 aspectos de cómo se ayuda a una madre a lograr una posición cómoda y segura para la lactancia materna en las 6 primeras horas después del parto y posteriormente según sea necesario durante la estancia en el hospital.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asegurarse de que la madre entiende por qué es importante adoptar una posición cómoda y segura. ✓ Explicar por qué hay que retirar las mantas o la ropa que se interponen entre la madre y el bebé. ✓ Ayudar a la madre a identificar cómo sostener a su hijo para facilitar los reflejos innatos del bebé y el agarre. ✓ Explicar los principios de cómo se coloca o sostiene al bebé (el bebé situado frente al pecho, cerca de la madre, con todo el cuerpo apoyado). 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizar un enfoque de ausencia de intervención (o de intervención) para promover el empoderamiento de la madre. El enfoque de intervención solo se usa tras pedir permiso y cuando se necesita ayuda adicional. ✓ Ofrecer ayuda adicional a una madre a la que se le ha practicado una cesárea para que consiga una posición cómoda. ✓ Ayudar a la madre a identificar posiciones útiles para un bebé más débil. 			
34. Mostrar cómo se ayuda a una madre a conseguir un agarre eficaz y cómodo, señalando al menos 5 puntos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observar primero a la madre amamantando, antes de recomendar cambios. ✓ Comprobar si la madre lleva al bebé hacia el pecho y no el pecho hacia el bebé. ✓ La boca del bebé está muy abierta. ✓ La barbilla del bebé toca la mama. ✓ Hay más areola visible por encima de la boca del bebé que por debajo. ✓ El labio inferior está evertido. ✓ Las mejillas del bebé están llenas, sin que se observen hoyuelos. ✓ Después de la toma, los pezones están intactos y no están deformados. ✓ Ausencia de dolor materno. ✓ Explicar o mostrar a la madre cómo liberar el agarre del bebé doloroso o poco profundo sin hacerse daño. ✓ Informar a la madre para que libere el agarre del bebé de la mama cuando el agarre sea doloroso o poco profundo. 			
Competencia 10. Ayudar a una madre a responder a los signos de hambre del bebé			
35. Entablar una conversación con una madre sobre 2 aspectos relacionados con la importancia del alojamiento conjunto de la madre y el bebé 24 horas al día.	Observación en la habitación de la madre		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar la importancia del alojamiento conjunto de la madre y el bebé:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprender a reconocer los signos de hambre del bebé y a responder a ellos. ✓ Facilitar el establecimiento de la lactancia materna. ✓ Facilitar el establecimiento del vínculo afectivo y el apego de la madre y el bebé. ✓ Permitir una alimentación perceptiva frecuente y sin restricciones. ✓ Aumentar el bienestar del bebé y de la madre (menos estrés). ✓ Mejorar el control de las infecciones (menor riesgo de propagación de enfermedades infecciosas). 	<p>Para prevenir errores en la identificación del bebé.</p>		<p>No escuchó a la madre cuando esta indicó que estaba cansada, que por favor llevaran al bebé fuera del cuarto. Solo indicó a la madre que mantuviera a su bebé para alimentarlo cuando tuviera hambre.</p>

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
36. Explicar 2 situaciones: 1 relativa a la madre y 1 relativa al bebé sobre cuándo es aceptable separar a la madre y al bebé mientras están en el hospital.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por razones médicas justificadas que afecten a la madre (por ejemplo, la madre está inconsciente o no puede sostener a su bebé). ✓ Por razones médicas justificadas que afecten al bebé (por ejemplo, si el bebé necesita respiración asistida o está inestable). 			
37. Describir al menos 2 signos iniciales de hambre y 1 signo tardío de hambre.	Pregunta o estudio de caso		
<p><u>Signos iniciales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El bebé se despierta lentamente. ✓ El bebé saliva o se vuelve (rotación) en busca del pecho. ✓ Pone los dedos o el puño en la boca o alrededor de ella. ✓ Vocaliza. <p><u>Signos tardíos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Llora. ✓ Se vuelve a dormir. 			
38. Describir al menos 4 razones por las que es importante la alimentación perceptiva.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La lactancia materna se ve facilitada tras la oleada hormonal. ✓ Desarrollo más rápido de la producción de leche (no hay retraso en la lactogénesis II). ✓ Menos congestión mamaria. ✓ La pérdida y el aumento de peso iniciales están dentro de los límites normales en el período posnatal temprano. ✓ La madre aprende a responder a su bebé. ✓ Menos llanto y menos tentación de complementar la lactancia materna. ✓ Evita que se desencadene el estrés (concentraciones de cortisol elevadas). ✓ El bebé aprende a autorregular la ingesta. ✓ Es esencial para el cuidado cariñoso y sensible de los niños. 			
39. Describir al menos 2 aspectos de la alimentación perceptiva (también denominada alimentación a demanda o dirigida por el bebé), con independencia del método de alimentación.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eliminar las restricciones de la frecuencia o duración de las tomas del bebé. ✓ Responder pronto a los signos del bebé por los que indica que necesita alimentarse, estar más cerca de la madre o que lo consuelen. ✓ Es esencial para el cuidado cariñoso y sensible de los niños. 			
Competencia 11. Ayudar a una madre a extraerse la leche			
40. Mostrar a una madre cómo se extrae la leche de la mama manualmente, señalando 8 puntos.	Observación		
Utilizar las habilidades básicas para comentar la importancia de:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear un entorno cómodo para facilitar el reflejo de “subida de la leche” (o reflejo de eyección de la leche). 2. Lavarse las manos. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
3. Contar con un cuenco o recipiente limpio para recoger la leche. 4. Masajear suavemente toda la mama. 5. Presionar, haciendo con los dedos una "C" alrededor del pecho, hacia la pared torácica alejándose de la areola. 6. Empujar los dedos hacia la pared torácica y apretarlos a la vez, rítmicamente; luego hacer una pausa. 7. Extraer leche de ambas mamas. 8. Esperar que una sesión dure 10-20 minutos hasta que el flujo de leche disminuya.			
41. Explicar al menos 3 aspectos del almacenamiento adecuado de la leche materna.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etiquetado y fechado de la leche extraída. ✓ Opciones de recipientes para almacenarla (bolsas, frascos de plástico o de vidrio). ✓ Almacenamiento higiénico. ✓ Temperatura y duración del almacenamiento. ✓ Signos de almacenamiento inadecuado y de descomposición. 			
42. Explicar al menos 3 aspectos de la manipulación de la leche materna extraída.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuidado adecuado de los recipientes y dispositivos de alimentación. ✓ Orden de uso de la leche: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fresca antes de ser almacenada. 2. Si utiliza leche almacenada o congelada, se usa primero la leche almacenada más antigua. ✓ Técnicas de descongelación y calentamiento. ✓ Manipulación de la leche humana previamente congelada y descongelada (no congelar de nuevo). ✓ Cuándo desechar la leche restante. 			
DOMINIO 6: AYUDAR A LAS MADRES Y A LOS BEBÉS CON NECESIDADES ESPECIALES			
Competencia 12. Ayudar a una madre a amamantar a un bebé de bajo peso o enfermo			
43. Ayudar a una madre a lograr una posición cómoda y segura para dar el pecho a su hijo prematuro, prematuro tardío o débil, señalando al menos 4 puntos.	Observación		
Utilizar las habilidades básicas para: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observar primero a la madre amamantando, antes de recomendar cambios. ✓ Dedicar más tiempo y más paciencia a los prematuros, los prematuros tardíos o algunos bebés más débiles, ya que quizá no abran la boca al ser estimulados o no abran la boca lo suficiente. ✓ Orientar a la madre para que lleve al bebé hacia el pecho y no el pecho hacia el bebé. ✓ Ayudar a la madre a identificar las posiciones más útiles para los bebés más débiles. ✓ Mostrar cómo hacer la compresión de la mama, que puede ser útil con los bebés prematuros, con bajo tono o con una succión débil. ✓ Mostrar a la madre cómo se extrae la leche materna directamente en la boca del bebé. ✓ Ayudar a la madre a identificar cómo y cuándo liberar el agarre del bebé doloroso o poco profundo (más frecuente con los bebés prematuros) sin hacerse daño. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
44. Entablar una conversación con una madre de un bebé prematuro, prematuro tardío o de peso bajo al nacer que no succiona eficazmente del pecho, incluyendo al menos 5 puntos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Facilitar el contacto prolongado piel con piel (método de la madre canguro) para mejorar la estabilización de la temperatura, la respiración y el ritmo cardíaco. ✓ Entablar una conversación con una madre sobre los motivos por los que puede ser necesario despertar al bebé en un plazo de 3 a 4 horas si no muestra signos de hambre. ✓ Observar cómo el bebé se agarra, succiona y traga. ✓ Hacer un seguimiento estrecho de problemas frecuentes como la hipoglucemia, una alimentación deficiente y la hiperbilirrubinemia. ✓ Entablar una conversación con la madre sobre la forma de evitar una pérdida de peso neonatal excesiva (más de 7% en el tercer día) y ajustar el plan de alimentación en consecuencia. ✓ Indicar a una madre que realice frecuentemente la extracción manual y la compresión de la mama. ✓ Explicar cómo se extrae la leche manualmente (véase más adelante). ✓ Explicar o mostrar cómo se alimenta con taza al bebé con la leche materna extraída. ✓ Explicar los efectos negativos de los chupetes y las tetinas mientras se establece la lactancia materna. ✓ Describir los medicamentos que pueden afectar a la lactancia materna. ✓ Explicar cómo dormir con seguridad. ✓ Explicar los signos de ingesta insuficiente o deshidratación en el lactante. ✓ Explicar el almacenamiento adecuado y la manipulación correcta de la leche materna extraída. ✓ Describir cómo se mantiene la lactación durante la separación de la madre y del bebé o la enfermedad de alguno de ellos. 			
45. Entablar con una madre separada de su bebé prematuro o enfermo una conversación sobre al menos 2 razones para que esté con su bebé en la unidad de cuidados intensivos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La madre ayudará a su bebé a curarse y a crecer mejor. ✓ Podrá amamantarlo antes y mejor. ✓ Podrá extraerse la leche con más facilidad. ✓ Podrá alimentar a su bebé (mediante una sonda u otros medios). ✓ Su hijo necesita su contacto, su calor y su voz. ✓ Cuando la madre no puede estar con su bebé en la unidad de cuidados intensivos, la presencia de otras personas significativas también es importante. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
46. Establecer una conversación con una madre de un bebé prematuro, prematuro tardío o vulnerable (incluidos los nacimientos múltiples) sobre la importancia de observar al menos 2 signos sutiles y cambios del comportamiento para determinar cuándo es adecuado amamantar.	Observación		
Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ La lactancia materna al pecho depende de la competencia y la estabilidad del lactante más que de cierta edad gestacional, posnatal o posmenstrual o cierto peso. ✓ Cómo reconocer los signos discretos de transición del sueño profundo al sueño activo y al despertar. ✓ Se guía a la madre para que no interrumpa la etapa de sueño profundo únicamente para la alimentación ordinaria. ✓ Se anima a la madre a que observe los signos de interés de su hijo por volverse en busca de la mama y succionar. ✓ La madre amamanta a su hijo cuando este muestra tales signos. 			
Competencia 13. Ayudar a una madre cuyo bebé necesita otros líquidos aparte de la leche materna			
47. Enumerar al menos 2 posibles contraindicaciones de la lactancia materna para el bebé y 2 para la madre.	Pregunta o estudio de caso		
<u>Contraindicaciones maternas:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Infección por el VIH, cuando las madres no pueden seguir el tratamiento durante todo el período de lactancia o las autoridades sanitarias nacionales no recomiendan la lactancia materna a las madres con infección por el VIH. ✓ Infección por el virus del Ébola. ✓ Virus del herpes simple de tipo 1: activo y en la mama. ✓ Medicamentos, sustancias y enfermedades específicas de la madre (véase Razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos de leche materna de la Organización Mundial de la Salud [OMS]). <u>Contraindicaciones para el bebé:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Galactosemia. ✓ Deficiencia congénita de lactasa. ✓ Algunos errores congénitos del metabolismo (fenilcetonuria, enfermedad del jarabe de arce) pueden requerir la administración de suplementos. 			
48. Describir al menos 4 indicaciones médicas para la suplementación de los recién nacidos amamantados: 2 indicaciones relativas a la madre y 2 relativas al recién nacido, cuando la lactancia materna no mejora tras la evaluación y el manejo competentes.	Pregunta o estudio de caso		
<u>Indicaciones para el bebé:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipoglucemia. ✓ Signos o síntomas que pueden indicar una ingesta inadecuada de leche (deshidratación significativa, pérdida de peso o retraso de las deposiciones). ✓ Hiperbilirrubinemia asociada a la baja ingesta de leche materna a pesar de la intervención pertinente. ✓ Algunos errores congénitos del metabolismo. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<p><u>Indicaciones maternas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retraso de la lactogénesis que provoca una ingesta inadecuada por parte del lactante. ✓ Producción insuficiente de leche relacionada con la insuficiencia de tejido glandular. ✓ Patología mamaria o cirugía mamaria previa que se traduzca en una producción de leche insuficiente. ✓ Separación temporal de la madre y el bebé, sin disponibilidad de leche extraída. ✓ Suspensión temporal de la lactancia materna. ✓ Dolor intolerable durante las tomas. 			
49. Describir al menos 3 riesgos de dar a un recién nacido amamantado alimentos o líquidos aparte de la leche materna sin que haya una indicación médica para ello.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puede interferir en el establecimiento de la producción de leche. ✓ Disminuye la succión del bebé al pecho, con la posibilidad de que se cree un ciclo de insuficiencia de leche y suplementación. ✓ Incluso una sola dosis de una preparación para lactantes altera significativamente la microbiota intestinal. ✓ Aumenta los riesgos de enfermedades y alergias. ✓ Las tomas prelácteas reducen la importancia del calostro. 			
50. En lo que respecta a las pocas situaciones de salud en las que no se puede o no se debe alimentar al pecho al bebé, describir, por orden de preferencia, las alternativas que se pueden utilizar.	Pregunta o estudio de caso		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leche extraída de la madre. 2. Leche humana de donantes. 3. Una preparación para lactantes. 			
51. Entablar una conversación con una madre que pretende alimentar a su bebé con una preparación para lactantes, señalando al menos 3 medidas que deben tomarse.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obtener información sobre el motivo por el que pretende alimentar a su hijo de forma mixta. ✓ Observar una toma para evaluar si hay indicaciones médicas para la suplementación. ✓ Abordar las dificultades más comunes de la lactancia materna. ✓ Responder a las necesidades, preocupaciones, preferencias y valores de la madre y la familia en relación con la alimentación mixta. ✓ Animar a la madre a mantener la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. 			
52. Mostrar al menos 3 elementos importantes para preparar en condiciones higiénicas las preparaciones para lactantes a una madre que necesite esa información.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para mostrar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpiar y esterilizar el equipo de alimentación y preparación. ✓ Utilizar agua hervida. ✓ Añadir la preparación para lactantes en polvo mientras el agua esté a más de 70 °C. ✓ Usar la cantidad exacta de la preparación para lactantes según se indica en la información sobre el producto. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enfriar el alimento rápidamente hasta alcanzar la temperatura de alimentación. ✓ Comprobar la temperatura de la preparación para lactantes antes de alimentar al bebé. ✓ Desechar la preparación para lactantes que no se haya utilizado en un plazo de 2 horas. ✓ Seguir las instrucciones del fabricante al utilizar una preparación para lactantes líquida concentrada. 			
Competencia 14. Ayudar a una madre que no está alimentando a su bebé directamente al pecho			
53. Enseñar a una madre cómo alimentar de forma segura a su bebé con una taza cuando sea necesario, mostrando al menos 4 puntos.	Observación		
Utilizar las habilidades básicas para mostrar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Medidas higiénicas de preparación (manos y utensilios). ✓ Cómo extraer la leche materna. ✓ Cómo conservar la leche materna extraída. ✓ Cómo manipular la leche materna extraída. ✓ Cómo preparar de forma segura una preparación para lactantes. ✓ Comprobar si el bebé está totalmente despierto, alerta e interesado en alimentarse. ✓ Sostener al bebé en posición semierguida durante las tomas. ✓ Inclinar la taza para que la leche apenas llegue a los labios del bebé. ✓ Dejar que el bebé tome la leche a lengüetazos a su propio ritmo. ✓ Cuando el bebé concluya la toma al estar saciado, sostenerlo en posición erguida y frotar suavemente o acariciar su espalda para que expulse los gases. ✓ Prestar atención a los signos de saciedad y respetarlos. 			
54. Describir a una madre al menos 4 pasos para alimentar de forma segura a un bebé con un suplemento.	Observación		
Utilizar las habilidades básicas para explicar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sostener al bebé en posición semierguida durante las tomas. ✓ Permitir que el bebé beba a su propio ritmo. ✓ Es posible que el bebé necesite hacer descansos breves durante la toma y eructar de vez en cuando (alimentación con pausas). ✓ Cuando el bebé concluya la toma al estar saciado, sostenerlo en posición erguida y frotar suavemente o acariciar su espalda para que expulse los gases. ✓ Prestar atención a los signos de saciedad y respetarlos. 			
55. Describir al menos 2 métodos de alimentación alternativos aparte de los biberones.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con una taza sin tapa o una cuchara. ✓ Con un gotero o una jeringa. ✓ Con un dispositivo para alimentarlo con el dedo mediante una sonda. ✓ Con un dispositivo de alimentación mediante una sonda situada en el pecho. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
56. Entablar una conversación con una madre que solicita biberones, tetinas y chupetes sin indicación médica, incluyendo al menos 3 puntos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Explorar los motivos por los que una madre pide un biberón, una tetina o un chupete. ✓ Abordar las preocupaciones que motivan su petición. ✓ Educar acerca de los riesgos del uso de biberones, tetinas o chupetes, especialmente en lo que respecta a la succión y al estado nutricional. ✓ Sugerir alternativas para calmar al bebé. ✓ Enumerar los posibles riesgos en cuestión de higiene relacionados con la limpieza inadecuada de los utensilios de alimentación. ✓ Explicar que si se alimenta al bebé con un biberón y una tetina se puede dificultar la lactancia materna, sobre todo si se usan el biberón y la tetina antes de haber establecido la lactancia materna o si el uso del biberón es prolongado. ✓ Indicar que los chupetes pueden sustituir a la succión, lo que puede dar lugar a una reducción de la producción de leche materna. ✓ Advertir a la madre de que el uso del chupete impide que la madre observe los signos sutiles de hambre del bebé, lo que puede retrasar la toma. ✓ Explicar que el uso de biberones con tetinas en los bebés prematuros hace más difícil que el bebé aprenda a mamar al pecho. 			
Competencia 15. Ayudar a una madre a prevenir o resolver las dificultades de la lactancia materna			
57. Entablar una conversación con una madre sobre al menos 4 formas diferentes de facilitar la lactancia materna para prevenir o resolver las dificultades o los problemas más comunes relacionados con las mamas durante la lactancia (pezones doloridos, congestión mamaria, madre que cree que no tiene suficiente leche, bebés con dificultades para succionar).	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para comentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contacto directo frecuente, piel con piel, entre la madre y el bebé. ✓ Alojamiento conjunto de la madre y el bebé las 24 horas del día. ✓ Importancia del contacto piel con piel y del alojamiento conjunto de la madre y el bebé para ambos progenitores. ✓ Signos de hambre del bebé, signos del agarre y la transferencia de leche adecuados, deglución del bebé y cómo retirarlo del pecho si la madre siente dolor. ✓ El bebé puede permanecer al pecho todo el tiempo que quiera. ✓ Frecuencia ilimitada y alimentación perceptiva. ✓ Se deben evitar los chupetes y los biberones durante las primeras semanas. ✓ Patrones de alimentación típicos: día y noche durante las primeras semanas y al menos 8 veces cada 24 horas, previendole más veces al día durante la primera semana. ✓ Percepción de la madre del suministro adecuado de leche (también en comparación con el calostro). 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cómo puede confirmar la madre, mediante la observación de signos específicos en el bebé, que la producción de leche es fiable y adecuada. ✓ La lactancia materna requiere práctica, paciencia y persistencia. 			
58. Describir al menos 4 elementos que se deben evaluar cuando una madre dice que su bebé llora con frecuencia.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Las expectativas de la madre sobre el comportamiento del bebé. ✓ Qué estrategias ha utilizado la madre para calmar a su hijo. ✓ La respuesta de la madre a los signos de hambre del bebé. ✓ Las necesidades de cercanía o consuelo del bebé. ✓ Signos de una buena colocación y un agarre eficaz. ✓ Succión, deglución y transferencia de leche. ✓ Los patrones de alimentación del lactante. ✓ Patrones de sueño y vigilia del bebé. ✓ El grado de ansiedad o cansancio de la madre. 			
59. Describir al menos 4 elementos de orientación anticipada que se deben dar a una madre sobre técnicas para calmar o tranquilizar al bebé antes de los chupetes o como alternativa a estos.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ofrecer el pecho de nuevo. ✓ Realizar el contacto directo, piel con piel, con la madre o con una persona de apoyo. ✓ Coger en brazos al bebé. ✓ Caminar, moverse. ✓ Mecerlo. ✓ Cantar. ✓ Interactuar con el bebé. ✓ Darle un masaje. 			
DOMINIO 7: ATENCIÓN EN EL MOMENTO DEL ALTA HOSPITALARIA			
Competencia 16. Garantizar una transición fluida tras el alta			
60. Describir al menos 2 fuentes disponibles a nivel local para obtener información oportuna sobre la alimentación del lactante y para el manejo de los problemas de alimentación.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visitas de seguimiento de un prestador de atención de salud. ✓ Centros de atención primaria. ✓ Prestadores de atención de salud comunitarios. ✓ Puericultores a domicilio. ✓ Consultorios de lactancia materna. ✓ Enfermeras, parteras, especialistas en materia de lactancia. ✓ Asesores de pares, grupos de apoyo entre madres. ✓ Líneas telefónicas de ayuda para la alimentación infantil que cumplan el código (no líneas telefónicas de empresas de productos de alimentación infantil). <p>** Añadir recursos disponibles localmente.</p>			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
61. Describir al menos 2 formas por las que el establecimiento de atención de salud se relaciona con los programas comunitarios para coordinar los mensajes sobre la lactancia materna y ofrecer continuidad en la atención.	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reuniones periódicas. ✓ Intercambio de información con regularidad. ✓ Debate sobre las necesidades de recursos de la población en la comunidad y en el establecimiento de atención de salud. ✓ Compartir los mismos materiales u otros similares con los padres. ✓ Formularios de derivación automática tras el alta. 			
62. Elaborar con una madre planes individualizados de alimentación tras el alta que incluyan al menos 6 puntos.	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para evaluar una toma y la salud general de la madre y el bebé, y luego elegir los puntos apropiados que sean pertinentes para las necesidades específicas de la madre y del bebé, con el fin de desarrollar un plan; por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Examinar lo que sabe la madre sobre los signos particulares de hambre de su hijo, ✓ Examinar la capacidad del bebé para lograr un agarre cómodo, y ✓ Examinar los signos de transferencia de leche con la deglución del bebé. ✓ Examinar los signos de ingesta adecuada de leche (heces y orina). ✓ Examinar lo que sabe la madre sobre la necesidad de su bebé de alimentarse frecuentemente, al menos 8 veces en 24 horas o más. ✓ Examinar con la madre la importancia del contacto visual con el bebé mientras lo alimenta. ✓ Recordar a la madre que debe dejar que el bebé termine de mamar del primer pecho, y luego debe ofrecerle el otro hasta que el bebé muestre que está satisfecho soltando el pecho. ✓ Examinar la posición de la madre (cómo sostiene al bebé) para lograr que las tomas sean cómodas y sin dolor. ✓ Examinar los conocimientos de la madre sobre cómo lograr o mejorar la producción y la eyección de la leche. ✓ Examinar los conocimientos de la madre sobre la extracción manual del calostro o la leche materna y por qué es útil. ✓ Reforzar la concientización de la madre sobre los riesgos de administrar otros líquidos y la importancia de la lactancia materna exclusiva durante 6 meses. ✓ Reforzar la concientización de la madre sobre los riesgos y usos de los chupetes y las tetinas. ✓ Hacer hincapié en que muy pocos medicamentos o enfermedades constituyen una contraindicación para la lactancia materna. ✓ Proporcionar a la madre fuentes de información precisas e indicarle cómo obtener ayuda si la necesita. ✓ Proporcionar a la madre información para mantener la lactancia materna y obtener apoyo de salud general en la comunidad. 			

Indicador del desempeño y respuestas previstas	Opciones a nivel nacional	Competente	Requiere mejora
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recordar a la madre que el aporte adecuado de alimentos y bebidas favorece su salud general, ya que no se necesitan alimentos especiales para la lactancia materna. ✓ *Según proceda* Orientación adecuada específica para la pareja madre-lactante. ✓ *Según proceda* Reforzar los conocimientos de la madre sobre las medidas para dormir con seguridad (lactancia materna y colecho). ✓ *Según proceda* Observar la capacidad de la madre para utilizar y cuidar correctamente el sacaleches, o extractor. ✓ *Según proceda* Observar la capacidad de la madre para preparar y utilizar correctamente la preparación para lactantes. 			
<p>63. Describir a una madre al menos 4 signos de alerta de ingesta insuficiente o deshidratación del lactante para que la madre se ponga en contacto con un profesional de atención de salud tras el alta.</p>	Observación		
<p>Utilizar las habilidades básicas para explicar los signos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El bebé suele dormir más de 4 horas. ✓ El bebé está apático. ✓ Está irritable o tiene un llanto débil. ✓ Siempre está despierto. ✓ Nunca parece estar satisfecho. ✓ Es incapaz de succionar. ✓ Hace más de 12 tomas al día. ✓ La mayoría de las tomas duran más de 30 minutos. ✓ No hay signos de deglución al menos cada 3-4 succiones. ✓ Escasa cantidad de orina al día. ✓ Ninguna deposición al día. ✓ Fiebre. 			
<p>64. Describir al menos 3 signos maternos de alerta para que la madre se ponga en contacto con un profesional de atención de salud tras el alta.</p>	Pregunta o estudio de caso		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agarre doloroso persistente. ✓ Bultos en las mamas. ✓ Dolor mamario. ✓ Fiebre. ✓ Dudas sobre la producción de leche. ✓ Aversión hacia el hijo. ✓ Tristeza profunda. ✓ Cualquier duda sobre la autoeficacia de la lactancia materna. 			

El nuevo paso 2 de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) se centra en la verificación para garantizar que los prestadores de atención directa tengan los conocimientos, la competencia y las habilidades para apoyar la lactancia materna, sobre todo durante los primeros días en los servicios de maternidad. Se ha diseñado este *Conjunto de herramientas de verificación de la competencia* para ayudar a los países y a los sistemas de atención de salud a vincular de manera viable las competencias con la práctica clínica.

El principio y la práctica de la verificación de la competencia están sólidamente establecidos en los servicios profesionales y clínicos. Sin embargo, la aplicación real de la verificación de la competencia es bastante más compleja, y los detalles del proceso son especialmente importantes. La verificación de la competencia es esencialmente “la prueba” de si un prestador de atención directa puede hacer el trabajo de forma precisa, sensible y correcta. Si un prestador de atención directa no puede demostrar claramente su competencia en una tarea, entonces se hace necesaria la formación o capacitación básica o de refuerzo.

En la **sección 1** se describe el marco de competencias. Hay 16 competencias específicas de manejo y apoyo de la lactancia materna categorizadas en 7 dominios únicos.

En la **sección 2** se ofrece información detallada sobre el principio y el proceso de verificación de la competencia, los detalles de la verificación de competencias clínicas específicas de la IHAN, así como las cualificaciones y las funciones de los examinadores. Se explican los conocimientos, las habilidades y las actitudes específicos que componen las competencias.

En la **sección 3** se describen las herramientas detalladas que se utilizarán para la verificación de la competencia, incluidos el *Formulario de verificación de la competencia*, el *Recurso del examinador*, las preguntas con varias opciones de respuesta para verificar los conocimientos, estudios de casos que implican una revisión exhaustiva de las situaciones clínicas, así como herramientas de observación de las habilidades y las actitudes.

En la **sección 4** se analizan las oportunidades para adaptar las herramientas del *Conjunto de herramientas* a los contextos de cada país.

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS
Américas

www.paho.org

