

tal da Republica já existe, prestando serviços com apreciáveis resultados a Inspectoria de Tuberculose, chefiando-a o patricio Placido Barbosa que tem a seu lado uma pleiade de colegas dos mais capazes. O Departamento Nacional de Saude Publica, no momento dirigido por Belisario Penna, velho batalhador pelo saneamento do Paiz, soffrerá em futuro proximo completa reorganização com a nacionalização de seus serviços. (Cruz, Alberto: *Arch. Bras. Med.* 491 (obro.) 1931.)

Dispensario Modelo "Clemente Ferreira" de São Paulo

Fazendo o diagnostico precoce, o Dispensario "Clemente Ferreira" de São Paulo dispõe, desde longa data, dum consultorio de diagnostico com a apparellagem necessaria para um reconhecimento prompto do mal em seu inicio, evita-se que os doentes se tornem bacilliferos e, pois, factores de contaminação, fontes de irradiação de contagio. Tambem como centro de educação sanitaria ainda age o dispensario como aparelho preventivo, sendo de grande projecção a sua actuação. Em 1930 inscreveram-se 3,108 pessoas e passaram de 1929, 304, total, 3,412. A percentagem dos tuberculosos sobre os consulentes variou de 6.4 a 15.6 nos diversos mezes. A concurrencia foi quasi igual nos diversos mezes do anno. Movimento dos pacientes sahidos durante o anno: eliminados por não soffrerem de tuberculose, nem serem suspeiros 2,856, dos quaes: homens, 1,239; mulheres, 1,617. Os não tuberculosos constituíram pois 92 por cento dos que concorreram ao dispensario, o que põe em foco a importancia do papel despistador do dispensario e suas funções prophylacticas. Soffriam de: bronchite, 1,691; lues, 502; pleurisia, 114; reumatismo, 37; nada apresentavam de morbido, 512; abandonaram o tratamento, 67; retiraram-se para o interior e Europa, 64; hospitalizaram-se no Hospital Central da Sta. Casa, 32; no San. São Luis, Piracicaba, 3; falleceram durante o anno, 16; a percentagem de obitos foi de 5; tiveram alta apparentemente curados ou bastante melhorados, 34; passaram para 1931, 391; sendo 322 com o diagnostico firmado e 69 em observação; foram verificados tuberculosos durante o anno 282, dos quaes achavam-se; No. 1, grau de Turban-Gerhardt, 25; No. 2, 224; No. 3, 19; soffriam de tuberculose ganglio-pulmonar, 8; soffriam de tuberculose gangliar, 6; eram: homens, 158 ou 56 por cento; mulheres, 124 ou 44; brasileiros, 209 ou 74; estrangeiros, 73 ou 26; menores de 15 annos, 29 ou 10; adultos, 253 ou 90; abaixo dos 20 annos, 69; entre 20 e 50, 209 ou 74; acima de 50, 4; brancos, 259 ou 90.8; de cor, 123 ou 8.19; solteiros, 151 ou 54; casados, 119 ou 42; viuvos, 12; casaes sem filhos, 100. Havia antecedentes pessoas em 94 pacientes; havia antecedentes de familia em 46 pacientes; 18 apresentavam antecedentes alcoolicos ou 6. Occorreu cohabitación com tuberculosos favorecendo o contagio em 34 casos, sendo em 24 pacientes ou irmãos a fonte do contagio. Houve reincidencia 10 vezes. Marcha: aguda, 119 ou 42.2 por cento; chronica, 103 ou 57.8; lesões bilateraes. 140 ou 50; lesões unilateraes, 137 ou 49; pulmão direito, 83 ou 60; pulmão esquerdo, 54 ou 40; tuberculose pulmonar só, 267; tuberculose pulmonar e laryngea, 2; tuberculose gangliar, 5; tuberculose pneumo-gangliar, 8; total: 282. A tosse figurou no quadro clinico como symptoma inicial em 69 por cento dos casos e a hemoptyse ou esputo sanguineo em 45 por cento.

Occorreram, ainda, com frequencia, as formas agudas da molestia, que se implantam em organismos anergicos, em terrenos virgens, sem immundade silenciosa. Foi rara, no anno transacto, a associação da localização laryngéa

á tuberculose pulmonar. Foram mais frequentes as formas mixtas-productivo-exsudativas, fibro-caseosas. As de caracter predominantemente caseoso ou exsudativo foram de menor occurencia. A molestia remontava a menos de 6 mezes em 143 doentes ou 50 por cento; de 6 mezes a 1 anno em 92; de 1 a 2 annos em 92; de 2 a 5 annos em 15; de mais de 5 annos em 3. No momento da admissão, 229 pacientes ou 81 por cento apresentavam esscarros bacilliferos, sendo que 186 exhibiam tambem fibras elasticas; 34 não eliminavam bacillos e 19 não esscarravam. Foi, pois, ainda predominante a percentagem de tuberculose aberta, entre os que procuraram o dispensario já com a molestia verificada. Entretanto, foi baixa a proporção dos tuberculosos sobre os consulentes inscriptos, demonstrando a frequencia com que nos batem as portas, pessoas á simples suspeita do mal. Recorreu-se á prova de von Pirquet em 196 pacientes, sendo 125 positivos. A pesquisa de albumina nos esscarros desprovidos de bacillos foi feita em 20 doentes, sendo 13 vezes positiva. Foram realizados 279 exames radioscopicos, sendo todos positivos. Os exames clinicos concordavam com os exames radioscopicos 192 vezes. Natureza das habitações: Casas particulares, 146 ou 53 por cento; habitações collectivas, 128 ou 46 por cento; habitações ignoradas, 8. Impressão geral das habitações: Casas em bom estado hygienico, 96 ou 35 por cento; casas em regular estado, 170 ou 62 por cento. Numero de peças da habitação; 69 pacientes ou 24.5 por cento occupavam uma só; 108 ou 39 por cento occupavam 2; 51 ou 20 por cento occupavam 3; 24 ou 8 por cento occupavam 4; 6 ou 5 por cento occupavam 5; 1 occupava 7 peças. Dormiam sós em seus quartos 69 pacientes ou 24.5 por cento; dormiam com 1 pessoa 71 ou 25; com 2 pessoas 58 ou 20.5; com 3, 36 ou 12.9; com 5, 16 ou 5.8; com 6, 9. Numero de janellas do aposento do enfermo: 1 só, 235; 2, 33; 3, 22; 0, 4; ignoradas, 8. A percentagem dos doentes que dormiam sós seus leitos foi de 57 por cento, superior á do anno passado em que foi apenas de 50 por cento; a maior parte das vezes são crianças que dormem no mesmo leito com os pais ou parentes bacilliferos. Tambem em 43 por cento dos casos dormiam os doentes no mesmo quarto com pessoas sãs. (Ferreira, C.: *Jornal dos Clin.* 345 (15 dbro.) 1931.)

Os preventorios infantis, os preservatorios de crianças, reduzem os casos de primo-infecção e, pois, restringem os casos de reinfecção, limitam o numero de adultos tuberculosos. O Preservatorio de Bragança, unico instituto no genero, de que até hoje dispõe o Estado de São Paulo, annualmente presta serviços prophylacticos de alta monta e é para se lamentar que não possa elle ser ampliado com varios pavilhões. O movimento do referido preservatorio em 1930 foi o seguinte: Existiam a 31 de dezembro de 1929, 183 crianças, das quaes 58 meninos e 125 meninas, de 2 a 18 annos. No decorrer do anno ingressaram 20 meninas e 19 meninos, tendo fallecido 1 menina de 7 annos de meningite, provavelmente tuberculosa e 1 menino de 11 annos de neoplasia cancerosa. A 31 de dezembro findo, achavam-se no estabelecimento 194 crianças, sendo 134 meninas de 1 a 18 annos e 60 meninos de 1 a 12 annos. As installações do preservatorio têm sido nos ultimos annos ampliadas e melhoradas. (Ferreira, Clemente: *Jor. Clin.* (dbro. 30) 1931.)

A Chalmoogra no Brasil

O Sr. P. H. Rolfs, consultor tecnico de Agricultura do Estado de Minas Geraes, onde se encontra desde 1921, como organizador que foi da Escola Superior de Agricultura de Viçosa, a convite da Sociedade Nacional de Agricultura, realizou ali, uma importante conferencia acerca da aclimação e domesticação das especies de plantas anti-lepricas. Dentre os paizes da America do Sul, goza o Brasil a primazia quanto á aclimação da chalmoogra (*Taraktogenos kurzii*) e, bem assim, na domesticação da Sapucainha (*Carpotroche* Spp.). Já ficou plenamente demonstrando que o clima de algumas zonas de Minas, presta-se admiravelmente para a cultura da chalmoogra e que esta planta pode ser propagada asexualmente.