

mento de mercadorias provenientes da Índia. (Calmette e Salimbeni opinam que a peste foi importada de Porto.) Depois, a peste appareceu em Rosario, e quasi em seguida em Buenos Aires. No Brasil a existencia da peste foi oficialmente declarada em Santos no 18 de outubro de 1889, sendo depois transportada a São Paulo e logo a Rio de Janeiro (7 de janeiro de 1900), extendendo-se immediatamente a Campos, Nichtheroy, São João de Barra, Petropolis, Fortaleza, Porto Alegre, Paranaguá, Recife, Victoria, Aracajú, Belém e São Luiz do Maranhão. No Rio de Janeiro, durante 9 annos, a doença grassou com alguma intensidade, alcançando em 1903 e 1904 coefficients de 105.7 y 92.3, respectivamente, por 100,000 habitantes. Actualmente o mal tem diminuido, e os casos, algo raros, ou procedem de antigos focos ou são importados, de modo que desde 1914 até agora no tem grande importancia estatística. De 1900 a 1926, ou seja 26 annos, houveram 3,923 casos e 1,818 obitos. A porcentagem nos homens se approximou a 60. A peste no Rio tem seu apice na primavera. Das 3 formas, a bubonica representa 93.3; a septicemica, 4.8; e a pulmonar, 2 por cento. Nos casos bubonicos predominou a localização infra-abdominal, com 71.9 por cento, vindo em segundo lugar a supra-abdominal, com 20 por cento, e por fim a suprainfra-abdominal, com 8.1 por cento. No Estado de Parahyba, nos 3 municipios de Campinas Grande, Sape e Princeza, tem habido de 1912 a 1926 154 casos com 140 obitos, habendo um periodo, de 1915 a 1922, sem casos ne obitos. Na cidade de São Paulo, de 1899 a 1926 foram denunciados 75 obitos, sem apenas nenhum nos annos de 1901, 1909, 1916, 1917, 1918, 1923, 1924 y 1926. No resto do Estado denunciaram-se 103 obitos de 1900 a 1926, em 12 municipios, incluindo Santos, Campinas, São Carlos e Guaratinguetá. No Estado de Ceará denunciaram-se 157 obitos de 1903 a 1922 (habendo 11 annos desse periodo em que não os houvera): em Maranguape, 31, em 1903; e em Jardin, 9, em 1918. Em Recife houveram 514 casos e 473 obitos de 1902 a 1923, sem apenas nenhum de 1924 a 1926. No Estado de Rio de Janeiro, nas cidades de Nichtheroy, Campos, Barra do Pirahy e São Gonçalo houveram 114 casos e 61 obitos de 1906 a 1927, habendo 12 annos sem obitos. Em Belém houveram 238 casos e 151 obitos de 1903 a 1922, com um intervalo de 1913 a 1921 sem casos. No Estado de Rio Grande do Sul, de 1903 a 1926 inscriveram-se 393 casos e 608 obitos, incluindo 254 casos e 392 obitos na capital (Porto Alegre) e 46 e 43 em Rio Grande. (*Informes Estatísticos sobre a Peste no Brasil*, Dep. Nac. Saude Pub.)

A Raiva no Ceará

Justa diz que a hidrofobia humana não pôde ser considerada infrequente na nosologia do Estado do Ceará. Em menos de uma decada de clinica em Fortaleza, tem tido conhecimento de varios casos dessa molestia, pois é sem remissão verificados na capital ou em localidades proximas. Na grande maioria, as vitimas, por penuria para se transportarem á cidade, ou por ignorancia, não recorreram ao amparo proporcionado pelo Instituto Pasteur ou fizeram-no serodiantemente e não colheram o beneficio almejado. O autor tivera oportunidade, dentro do espaço de 8 annos, de observar 2 casos de raiva humana em adultos do sexo masculino. O primeiro em data, foi em pessoa residente em Fortaleza e que sómente por extrema ignorancia deixou de utilizar a vaccina de Pasteur. O mais recente, embora solicitado para receber o tratamento profilatico, não atendeu ao conselho salutar e pagou com morte horrivel a sua negligencia. (Justa, A.: *Ceará Medico*, jan., 13, 1931.)

Trachoma

Ceará.—O Ceará occupa o 2º lugar na estatística da cegueira no Brasil, é assim que em 10,000 habitantes, 15.16 são cegos, entes portanto inutilizados para o trabalho activo e peso morto na balança economica do Estado, constituindo um grande deficit social. Deixando o Cariry, onde desde a primeira metade do seculo passado vem grassando assustadoramente, o trachoma já se alastrou por todo o