

ción higiénica. Contra ciertas enfermedades, como tifo, peste, y oncocerciasis, los trabajos se realizaron en cooperación con la Oficina Sanitaria Panamericana. El propósito de los distintos Servicios ha sido invariablemente fomentar el desarrollo de las colectividades y acrecentar las posibilidades económicas y el comercio internacional.

### NOMENCLATURA CENTROAMERICANA DE CASOS DE SÍFILIS\*

SÍFILIS Adquirida	Primaria	Chancro:	{ Genital, extragenital o perigenital.
		Linfadenitis	
		Estado Pre-serológico:	{ Investigación ultramicroscópica positiva por <i>Treponema pallidum</i> .
		Estado Serológico:	{ Reacción serológica de la sangre positiva. Técnicas de fijación del complemento y floculación.
	Secundaria	Activa:	{ Roséola. Placas mucosas, etc.
		Visceral:	{ Manifestaciones viscerales recientes.
		Recurrente:	{ Lesiones muco-cutáneas. Relapso serológico, etc.
		Latente Precoz:	{ Menos de tres años de duración. Ausencia de lesiones activas. Reacción serológica de la sangre positiva o negativa. L. C. R. normal.
	Terciaria	Cutáneo-Mucosa:	{ Leucoplasias. Gomas, etc.
		Osea:	{ Osteítis. Osteo-artritis gomatosas, etc.
		Cardio-Vascular:	{ Aortitis. Aneurismas. Insuficiencias valvulares, etc.
		Nerviosa:	{ <i>Meningo-vascular</i> : Hemiplejía, etc. { <i>Parenquimatosa</i> : P.G.P. y Tabes, etc. { <i>Asintomática</i> : L.C.R. anormal.
Visceral:		{ Manifestaciones viscerales tardías.	
Latente Tardía:		{ Más de tres años de duración. Ausencia de lesiones activas. Reacción serológica de la sangre positiva o negativa. L.C.R. normal.	

\* Ponencia presentada ante el Primer Congreso Centroamericano de Venereología por el Dr. J. Amador Guevara.

Sifilis Congénita	Secundaria	Activa:	{ Coriza sifilítico. Pénfigo. Otras lesiones de tipo secundario.
		Latente Precoz:	{ Menos de tres años de duración. Ausencia de lesiones activas. Reacción serológica de la sangre positiva o negativa. L.C.R. normal.
	Terciaria	Cutáneo-Mucosa:	{ Perforaciones del velo del paladar. Otras distrofias, etc.
		Ocular:	{ Queratitis intersticial. Atrofia del nervio óptico, etc.
		Ósea:	{ Hidrartrosis. Tibia en forma de sable, etc.
		Auditiva:	{ Disminución auditiva. Sordera, etc.
		Nerviosa:	{ <i>Meningo-vascular</i> : Meningitis. Arteritis cerebral, etc.
			{ <i>Parenquimatosa</i> : Parálisis juvenil progresiva. Tabes juvenil, etc. { <i>Asintomática</i> : anormalidad del líquido cefalorraquídeo.
	Dental:	{ Dientes de Hutchinson. Otras deformaciones dentales, etc.	
	Visceral:	{ Otras manifestaciones viscerales tardías.	
Latente Tardía:	{ Más de tres años de duración. Ausencia de lesiones activas. Reacción serológica de la sangre positiva o negativa. L.C.R. normal.		

*La histamina contra el mareo.*—Debido a los éxitos alcanzados en el tratamiento de algunos casos de vértigo aural con la histamina, y a la semejanza de este síndrome con los síntomas complejos del mareo, se estudió el efecto de dicha droga en 54 soldados que viajaban de San Francisco a las Islas Marshall. Todos realizaban su primer viaje de mar y se marearon a las 12 horas de viaje con malestar, náuseas y vómitos, sintiéndose suficientemente indispuestos para rehusar alimentos y guardar cama. Con el objeto de determinar la sensibilidad individual a la histamina, se les inyectó por vía intradérmica 0.1 mg a cada uno. Del grupo se dejaron 15 como testigos y los 39 restantes recibieron tres dosis de 0.5 mg de histamina por vía intramuscular a intervalos de tres horas, sin observarse reacciones desfavorables. Después de la segunda inyección de 0.5 mg, 20 habían mejorado lo suficiente para ingerir alimentos y caminar sin sensación de vómito o mareo. A la mañana siguiente, después de 3 inyecciones, 37 enfermos estaban completamente exentos de todo síntoma. Todos los testigos continuaron mareados y así siguieron por tres días más, a pesar del tratamiento con escopolamina, aspirina y otras drogas.—Bull. U. S. Army Med. Dept., 118, agto. 1946.