

# Tamizaje del cáncer de cuello uterino en las Bahamas<sup>1</sup>

Según datos proporcionados por el Departamento de Estadística, Bahamas tiene cerca de 96 830 habitantes de sexo femenino entre los 25 y 69 años de edad. Pero aunque esto representa la población destinataria, cada año se examinan solo 6000 frotis de Papanicolaou. El Hospital Princess Margaret en New Providence es el único lugar donde se estudian frotis citológicos en el laboratorio. Por consiguiente, los frotis que se efectúan en las Islas Familia tienen que transportarse a Nassau para la lectura, lo cual a menudo atrasa considerablemente la obtención de los resultados.

El cuadro 1 muestra los resultados de los frotis de Papanicolaou obtenidos durante un período reciente de 3 años. En 1993 y 1994 se atribuyeron 11 y 10 defunciones, respectivamente, a cáncer de cuello de útero (All Bahamas, Unidad de Información Sanitaria).

**CUADRO 1. Resultados de los frotis de Papanicolaou examinados en el Hospital Princess Margaret, Bahamas, 1993 a 1995**

Resultado	Año			
	1993	1994	1995	1993-1995
Atipia benigna	230	236	271	737
Infección por virus del herpes simple	—	4	9	13
Infección por virus del papiloma humano	56	78	62	196
Displasia leve o moderada	52	39	50	141
Carcinoma in situ o displasia grave	19	28	40	87*
Carcinoma invasor	8†	5‡	5§	
Anormal				
(No.)	365	390	437	1 192
(%)	5,7	6,3	7,7	6,5
Frotis en total	6 431	6 223	5 690	18 344

\* Hubo 67 casos de carcinoma in situ.

† Hubo siete casos de carcinoma escamocelular y uno de adenocarcinoma.

‡ Hubo tres casos de carcinoma escamocelular y dos de adenocarcinoma.

§ Hubo tres casos de carcinoma escamocelular y dos de adenocarcinoma endometrial.

Según observaciones anecdóticas del personal de laboratorio, cada año se examinan más frotis repetidos que frotis de pacientes nuevas, lo cual sugiere que muchas mujeres con vida sexual activa no se hacen el Papanicolaou con regularidad. El tamizaje se suele hacer después del parto y son 6000 aproximadamente las mujeres que dan a luz cada año. Se necesita urgentemente un programa de concienciación pública para mujeres sexualmente activas que no hayan parido.

Para satisfacer esta necesidad, últimamente se han puesto en marcha programas de tamizaje en cinco clínicas piloto: dos en New Providence, uno en la Gran Bahama, uno en Abaco y uno en Eleuthera. También se establecerá un programa nacional de salud reproductiva en marzo de 1997.

<sup>1</sup> Extraído de un informe por Claudette Harry, Representación de la OPS/OMS, Nassau, Bahamas. □