

# Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional

**Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste  
notificados en la Región de las Américas, hasta el  
31 de octubre de 1985.**

| País y división<br>administrativa principal | Cólera<br>Casos | Fiebre amarilla |             | Peste<br>Casos |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|                                             |                 | Casos           | Defunciones |                |
| <b>BOLIVIA</b>                              | -               | 49              | 33          | -              |
| Cochabamba                                  | -               | 2               | 2           | -              |
| La Paz                                      | -               | 47              | 31          | -              |
| <b>BRASIL</b>                               | -               | 7               | 5           | 33             |
| Bahía                                       | -               | -               | -           | 11             |
| Ceará                                       | -               | -               | -           | 22             |
| Mato Grosso                                 | -               | 5               | 3           | -              |
| Rondônia                                    | -               | 1               | 1           | -              |
| Pará                                        | -               | 1               | 1           | -              |
| <b>COLOMBIA</b>                             | -               | 4               | 4           | -              |
| Antioquia                                   | -               | 1               | 1           | -              |
| Guaviare                                    | -               | 2               | 2           | -              |
| Meta                                        | -               | 1               | 1           | -              |
| <b>ECUADOR</b>                              | -               | -               | -           | 3              |
| Loja                                        | -               | -               | -           | 3              |
| <b>ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>            | 3               | -               | -           | 14             |
| Guam                                        | 2               | -               | -           | -              |
| Missouri                                    | 1 <sup>a</sup>  | -               | -           | -              |
| Nuevo México                                | -               | -               | -           | 13             |
| Colorado                                    | -               | -               | -           | 1              |
| <b>PERU</b>                                 | -               | 26              | 15          | 21             |
| Cajamarca                                   | -               | -               | -           | 10             |
| Cuzco                                       | -               | 7               | 5           | -              |
| Huánuco                                     | -               | 6               | 2           | -              |
| Junín                                       | -               | 7               | 5           | -              |
| Madre de Dios                               | -               | 2               | 1           | -              |
| Piura                                       | -               | -               | -           | 11             |
| San Martín                                  | -               | 4               | 2           | -              |

<sup>a</sup>Caso de laboratorio.

## EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA EN BOLIVIA

En mayo de 1985 la Unidad Sanitaria de La Paz, Bolivia, informó que se había producido una epidemia de fiebre amarilla en las provincias de Nor Yungas, Sud Yungas y Larecaja, situadas al nordeste de esa capital. La zona es de clima subtropical y su economía depende principalmente de actividades relacionadas con la agricultura y la explotación del oro. Se caracteriza además por una acentuada movilidad de la población, debida a la producción minera.

El primer caso de fiebre amarilla se presentó el 16 de enero de 1985 y para el 14 de mayo, fecha en que se notificó el último caso, ya habían enfermado 44 personas de las cuales 28 fallecieron. Ninguno de los pacientes había sido vacunado contra la fiebre amarilla. La tasa de letalidad fue de 63,6%, habiéndose confirmado la causa de defunción en el laboratorio de histopatología.

## Vigilancia de SIDA en las Américas

Al 30 de junio de 1985 26 países de la Región de las Américas habían notificado a la OPS sobre los casos confirmados de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Para ello los países han utilizado el criterio de definición

de casos establecido por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América. Once países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Vene-

**Cuadro 1. Número de casos confirmados o sospechosos, y defunciones por SIDA, ocurridos en las Américas,<sup>a</sup> de 1979 a junio de 1985, inclusive.**

| País                      | Casos       |             | Defunciones |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | Confirmados | Sospechosos |             |
| Argentina                 | 26          | ...         | 13          |
| Bahamas                   | 2           | ...         | ...         |
| Barbados                  | 4           | 4           | 1           |
| Bermuda                   | 10          | ...         | 10          |
| Brasil <sup>b</sup>       | 262         | 54          | 109         |
| Canadá                    | 248         | -           | 124         |
| Colombia                  | 4           | ...         | 2           |
| Costa Rica                | 6           | ...         | 3           |
| Chile                     | 5           | ...         | 3           |
| Estados Unidos de América | 11.497      | -           | 5.710       |
| Grenada                   | 2           | ...         | ...         |
| Guadalupe                 | 9           | ...         | ...         |
| Guatemala                 | 1           | 4           | 1           |
| Guayana Francesa          | 9           | 2           | 4           |
| Haití                     | 377         | 239         | 88          |
| Honduras                  | 1           | ...         | 1           |
| Jamaica                   | 2           | ...         | 1           |
| Martinica                 | 2           | ...         | -           |
| México                    | 24          | ...         | 8           |
| Panamá                    | 3           | 1           | 1           |
| Perú                      | ...         | 1           | ...         |
| Santa Lucía               | 1           | 2           | 1           |
| San Vicente y Granadinas  | 1           | ...         | 1           |
| Suriname                  | 3           | 4           | 1           |
| Trinidad y Tabago         | 16          | ...         | ...         |
| Uruguay                   | 8           | 17          | 4           |
| Venezuela                 | 24          | ...         | 17          |
| Total                     | 12.547      | 328         | 6.103       |

... Datos no disponibles.

- Ninguno.

<sup>a</sup>Al 30 de junio de 1985, no se habían notificado casos de SIDA en ninguno de los siguientes países: Antigua, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, e Islas Turcas y Caicos. No se recibió información de República Dominicana, San Bartolomé ni San Martín.

<sup>b</sup>Datos hasta el 22 de abril de 1985.

zuela) notificaron un total de 364 casos. Dos países no hispano-parlantes de Sudamérica (Guayana Francesa y Suriname) informaron 12 casos adicionales. Estados Unidos y Canadá notificaron la cantidad más importante, un total de 11.745 casos. En el Caribe, 11 países (Bahamas, Barbados, Bermuda, Grenada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tabago) notificaron un total de 426 casos. Desde que los Estados Unidos informó sobre los primeros casos, en junio de 1979, se han registrado 12.547 casos en la Región. Estos datos se resumen en el cuadro 1.

Actualmente, la definición de un caso de SIDA se basa solamente en criterios clínicos. Por lo tanto, es difícil estimar la calidad (en términos de exceso o falta de notificación) de esta información. Es por lo demás imposible distinguir los pacientes que adquieren la enfermedad en otro país y no

son diagnosticados hasta que regresan a su país natal de los pacientes que, después de ser diagnosticados en otro país, regresan a su país natal en donde puede que sean registrados de nuevo. Tampoco es posible determinar cuántos casos sospechosos se convertirán en casos confirmados. Según informaciones epidemiológicas, la transmisión autóctona está ocurriendo en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Haití y Trinidad y Tabago, y tal vez en Venezuela.

Es evidente que el problema de SIDA va en aumento. Desde que la OPS inició el registro de los casos de SIDA hacia fines de 1983, cada seis meses se incorporan a la lista nuevos países a un ritmo creciente. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1985, ocho países adicionales han notificado la ocurrencia de SIDA.

(Fuente: Unidad de Epidemiología, OPS.)