

IMPORTANTE



- Debe completar los 5 días de tratamiento con molnupiravir y no interrumpirlo, aunque se sienta mejor.
- No comparta este medicamento con otras personas, aun cuando los signos de la enfermedad de las otras personas sean similares a los suyos.
- Este medicamento requiere prescripción médica.

Más información:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Tratamientos y medicamentos para el COVID-19, 2022. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html>

OPS/HSS/MT/COVID-19/22-0022

© Organización Panamericana de la Salud, 2022. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Recomendamos que utilice este calendario como recordatorio de sus tomas de 800 mg (4 cápsulas de 200 mg) cada 12 horas. En caso de olvido de una toma referirse a la pregunta "¿Qué hacer ante el olvido de una dosis?" dentro del folleto.

	Día 1 Fecha:	Día 2 Fecha:	Día 3 Fecha:	Día 4 Fecha:	Día 5 Fecha:
Por ejemplo:					
 Mañana 4 x 200 mg 					
Hora: 8:00 a. m.					
 Noche 4 x 200 mg 					
Hora: 8:00 p. m.					

MOLNUPIRAVIR PARA EL TRATAMIENTO DE LA COVID-19 INFORMACIÓN PARA PACIENTES



¿Para qué sirve el molnupiravir?

El molnupiravir es un medicamento oral para tratar la COVID-19 leve y moderada en personas de 18 años o más que presenten riesgo de hospitalización y progresión a enfermedad grave, cuando las opciones de tratamiento alternativas no se encuentren accesibles o sean clínicamente inapropiadas.

Este medicamento no reemplaza la vacuna contra la COVID-19 ni previene el contagio del SARS-CoV-2.

¿Cuál es la dosis del tratamiento con molnupiravir?

Se deben tomar **800 mg cada 12 horas durante 5 días completos**. Es necesario verificar los miligramos de cada cápsula para calcular el número de cápsulas de cada toma. Por ejemplo, **si la cápsula es de 200 mg, se tomarán 4 cápsulas por toma**.

Se recomienda ingerir las tomas a la misma hora todos los días y tomar las cápsulas con suficiente agua (con o sin alimentos).

¿Tiene efectos secundarios?

Su médico le informará de los beneficios y los riesgos de usar este medicamento. Como todos los medicamentos, el molnupiravir puede tener efectos no deseados. Consulte en su centro de salud más cercano o a su médico si tiene dificultades para respirar o si se le inflaman la cara, los labios, la lengua o cualquier otra parte del cuerpo.

¿Qué hacer si olvida de tomar molnupiravir?

Si se olvida una toma:

- Si han pasado menos de 10 horas desde el momento que tenía que tomar el medicamento, aún está a tiempo de tomar esa dosis olvidada y la siguiente dosis en el horario habitual.
- Si han pasado más de 10 horas desde el momento en el que le correspondía tomar el medicamento, no tome la dosis olvidada; solo tome la siguiente dosis en el horario habitual.



¿Se puede utilizar molnupiravir durante el embarazo y la lactancia?

Se recomienda **NO tomar** molnupiravir durante embarazo o la lactancia.



¿Se debe evitar el embarazo durante y después del uso de molnupiravir?

Se aconseja tomar medidas para evitar un posible embarazo durante el transcurso del tratamiento y durante un tiempo después de haber tomado la última dosis. Las personas en edad reproductiva pueden seguir los consejos que se indican a continuación:

MUJERES Y OTRAS PERSONAS CON APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

- Resulta aconsejable evitar las relaciones sexuales durante los días del tratamiento o, en su caso, utilizar métodos anticonceptivos confiables hasta 4 días después de tomar la última dosis de molnupiravir. Por otra parte, en caso de relaciones sexuales con penetración, si la pareja sexual está tomando molnupiravir o lo tomó hace poco, debe usarse un método anticonceptivo confiable hasta 3 meses después de tomar la última dosis de molnupiravir.

HOMBRES Y OTRAS PERSONAS CON APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

- Resulta aconsejable evitar las relaciones sexuales durante los días del tratamiento o, en su caso, utilizar métodos anticonceptivos confiables hasta al menos 3 meses después de tomar la última dosis de molnupiravir.

